



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

3

1372


C82

PARA

PHRASIS, IN NONVM LIBRUM Rhazæ Medici Arabis clariss. ad
Regem Almanforem, de singularū
corporis partium affectuum
curatione, autore An-
drea wesalio Bru-
xellensi Medi-
cine candi-
dato.

Louanij ex officina Rutgeri Resch.
Mense Februar.

1537.



ORNATISS.

VIRO D. NICOLAO FLORENTINO
et inuictiss. Caroli Cæsaris Medico peritiss.
Andreas wesalius Bruzellenfis. S.

R Ecce nimirum veteres non parum interesse iudicauerunt, vir doctiss. qua quis ratione in artibus ac scientiis versaretur, hoc est, exactane in illis seruaret methodum, & a primis ad secunda, ac sic deinceps ad proxime sepe consequentia debito transiret ordine, an vero prout vnūquodque se casu obtulisset, ita vel primum, vel secundum ab eo haberetur. Quod cum tu minime ignorares, meque aliquot ab hinc annis, Medicinæ studio operam daturum intelligeres, operæ pretiū fore duxisti, præclarissimam quandam longeque vtilissimam studendi in arte Hippocratica mihi præscribere rationem, cui quidē summa, qua potui, diligentia semper insistens, mihi dictu, quāto meo cōmodo, nullisque adeo ambagibus, ad eam tandē peruenerim. Medicina partem quæ curatiua dicta cæteris,

A ii cum

PRAEFATIO.

eum ob hanc & illæ discantur, tum præstā-
tior est, tum ad vsum longe etiam accommo-
datior. Atq; hic adeo multum mirari cœpi
communem nostri temporis plurimorum
Medicorum in abigendis morbis rationē,
tantum a Græcorum, doctissimorūq; hoīm
modo euariatā, ac barbarorū, Arabūq; per-
petuo (prope dixerim) vestigijs tam perti-
naciter inherentem. Vnde nec abs re fore
duxi, ne quid illorum omnino nos fugiat,
vna cum Græcis (quos tuo exquisitissimo
iudicio semper præferre consueuisti) Arabes
quoq; hac in parte paulo diligentius confer-
re. Hanc etiam rationem excellētissimi Pa-
rienses medici suis tyronibus plurimum
commendarunt, sic fore sperantes, vt pro-
pediem, vetus illa, & ab Hippocrate autore
profecta ἱατρικὴ, magna cum mortalium vtī-
litate, prorsus reuocata, passim vigeat, sum-
pto paulatim artem hanc exercitantium ope-
ra, incremento. Cum igitur sic tuo & meo-
rum clarissimorum præceptorum consilio
obsequutus, Rhazen ex alijs primum in ma-
nus sumpsissem, ac majori cū studio ad Græ-
corum

PRAEFATIO. 3.

corum scripta, tanquam ad lapidem Lidii, examinasset (eum namque inter reliquos surgentis in curandi artificio primas tenere, a praeceptore meo D. Iacobo Syluio eruditissimo sane Medice artis professore subinde audieram) ita profecto placuit, ut dignum censeerem, qui sordibus ereptus, & elegantiori latini sermonis cultu circumdatus, a delicatioris quoque auris lectore reciperetur, maxime quod omnes fere locales morbos in tam exiguo opusculo persecutus sit, quodque non nisi in paucissimis a Græcorum decretis declinaret, ut hinc etiam quidam adstruere sint conati nonum hunc Rhazæ librum e Græca in Arabicam conuersum linguam, ac sic deinceps Rhazæ nomen illi præfixum. Sed manifeste reclamare videntur, tum incognita Græcis medicamina, tum ipse dictionis stylus & character, adeo horridus & incultus, quemadmodum est Arabum vniuersus, ut nihil omnino cum Græcorum illi concinnitate & elegantia conueniat, nec perinde facile, aut in Græcum, aut in Latinum sermonem transfundi se sinat. Atque hæc cogitanti

mibi,

P R A E F A T I O.

mihi, sæpi⁹ in diuersa distractus est anim⁹,
 nunc quidem ad hoc vrgens, vt quod æquū
 iudicasset, id ipsum aggrederer, nunc vero
 rei difficultate perpensa, ab hoc ipso rursus
 deterrens. Nam præter ea quæ dicta etiam
 nunc sunt, nonne vel molestissimum est, tot
 medicaminū, aliarumq; vocū interpretatio-
 nem, ad susceptum negotium omnino neces-
 sariā addiscere? Siquidē pauca admodum in
 eius libri translatiōe remedia inuenias, que
 non vel vitiate scripta, vel obscuris quibus-
 dam, aut etiā Arabicis dictionibus appella-
 ta sint. Sed vicit tandem publica utilitas,
 priuato commodo (si modo laborum fuga cō-
 modum dici mereatur) longe semper antese-
 renda. Neq; vero parum subsidij polliceri vi-
 debantur, qui difficillimæ simplicium me-
 dicamentorum scientiæ instaurationi incu-
 buerunt, quod ferme duodecim iam annos
 foelicitissima quæq; Medicorum ingenia, nec
 infœlicitet tentarunt, vt perrarus admodū
 alicuius nominis Medicus extiterit, qui
 non aliquid posteris, quod ad hanc scienti-
 am pertineret, relinquere sit conatus. Huc
 enim

PRAEFATIO. 4.

enim omnes tam nobis exoptatis sudoribus contendebat, ut videlicet pharmacopolarum officinas barbaris vocibus, ne dicam falsis pharmacis infertas, pristinae integritati restituerent. His igitur motus causis, atque horum adeo exemplo Rhazae versionem castigare aggressus sum, ut & immenso labore ceteros Medicinae candidatos liberarem, & ipse post hac autor ad hominum manus emendatiores perveniret, repurgatis non solum medicamentorum barbaris, latinisque auribus incognitis vocibus, sed tota etiam orationis serie in melius commutata, ut quae prius squalida & inculta essent, nec propter obscuritatem percipi possent, nunc quatenus fieri possit, & res ipsa ferat, splendeant, minusque adeo lectori negotium exhibeant. Verum nec hic quidem (quod forte ab interprete desideraretur) verbum semper verbo reddere conatus sum, imo potius paraphrastem egi, libere, quae ad rem necessaria iudicaui, subinde adiciens, & quaedam fusiore, quae nimirum obscuriora visa sunt, oratione explicans. Vnde etiam vereor nostras lucubratiunculas a quorundam vitiligatorum

PRAEFATIO.

torum moribus tutas minime futuras, ut
 qui nihil a sua horrida barbarie emutatum
 enouatumque velint, nec quicquam, quod ipsi
 non didicerint pensi habeant, repertis enim
 frugibus, glandem defendunt, nec cum Gryl
 lo in hominem redire volunt, ne aliquando
 fastuosa illorum inscitia vulgo turpiter in
 notescat. Quocirca vir praestantissime, pri
 mum hunc iuvenilem conatum, tua nominis
 celebritate commendatum, editionis aleam
 subire volui, utpote melius, ita a calumnijs
 tutum fore sperans. Siquidem tuam singula
 rem in Graecorum & Arabum scriptorum
 Medicinae cognitionem, & raram ac inau
 ditam philosophicarum rerum scientiam, re
 liquasque praecclaras animi tui dotes, tales
 alienae virtutis olores reueriti, pristinae Hip
 pocraticae artis studiosorum conatibus, male
 obliui ac detrahare desinent. Tibi autem eum
 debeo, quod summus ad Medicinam, & ad
 alias meliores disciplinas, mihi autor ex
 stiteris, nec adhuc cesses, subinde me doctis
 simis tuis literis ad ea studia incitare, tuoque
 patrocinio (quo ubique plurimum vales) a
pud ali

PRAEFATIO.

apud alios prouehere. Rogo itaq; vt hoc me-
orum studiorum praeludium, hilari atq; ex-
porrecta fronte, cōtra istos male feriatos de-
fendendum suscipias, ac per ocium quid in
eo praestiterim videas, donec maiora & tuæ
excellēti doctrinæ digniora parauero. Vale
vir literatissime, et nro Impatori Augustis.
Carolo, quo hoc praesertim tēpore carere orbis
Christian⁹ nō potest, diu foeliciterq; viuito.
Bruxellis Cal. Feb. An. M. D. XXXVII.

¶ Iodocus Velsius Hagienfis.

Nostros docta iuuant, placuerunt barbara quōdam,

Hoc Arabum dictat puluerulenta cohors.

Inter quos topici Rhazes medicaminis autor

Emicat, excellens utilitate sua.

Sed male quod uersus, patria cū gēte legatur,

Displicet, at posthac gravior extiterit.

Quod tibi Wefali merito tribuisse queamus,

Laus te certa manet, tu modo perge, sequor.

PARA

PHRASIS, IN NON VMLI.

brum Rhazæ Medici Arabis clariss. ad

Regem Almanforem, de singularū

corporis partium affectuum;

curatione, autore An.

drea wesalio Bru-

xellensi Medi-

cine candi.

dato.

¶ De capitis dolore.

Caput. i.

Ex fan-
guine.

Q Vando capitis ardori eiusdem ten-
sio & grauitas, oculorumq; ac faciei
rubor affuerint, & reliquum corpus tactu
calidum, pulsusq; magnus præcipue in tem-
poribus sentiatur, humeralis vena partis do-
lentis, aut eius, quam potissimum dolor ex-
ercet, secanda est. Deinde aqua rosacea vna
cum aceto ac oleo rosaceo sumenda, quæ sis-
mul tandiu, donec debitam crassitiem reci-
pian,

RHAZAE DE MOR. CVR. .6.

piant, agitentur, dein niue, aut fonte refrigera-
rata, capiti ab alto sunt infundenda. Aeger
autem a carniū esu & vino arcebitur, cæ-
gerum lentes cum posca & croco decoctas,
aut lenticulam solam aqua incoctam, & ole-
ra frigida, uel elixa, uel cruda, & infrigidan-
tes fructus, edat. Alium porro ex myroba-
lanis citrinis, prunis, tamarindis & sacca-
ro albiss. ducere expedit. Verum si hæc in-
efficacia sint, althææ semen aceto infusum,
donec iustam viscositatem obtineat, pistil-
lo contundito, ac in emplastri formam ca-
piti applicato. Quinetiam ex herbæ pulice-
ris semine aceto macerato, vtiliter cataplas-
ma capiti induces. Si iam comprehensis
notis pulsus veloces adsint, tactuq; ingens
percipiatur calor, nullo tamen rubore faci-
es, aut oculi suffundantur, neque vlla no-
tabili tensione laborent, statim inter ini-
tia ventrem medicaminibus bilem flauam
purgantibus soluere, deinde commemora-
tis localibus præsidijs vti, consiliū est. Ve-
rū naribus oleū violarū, aut cucurbitę dome-
sticę, aut nymphęę, aut florę salicū infunderē,
& h

Ob bilis
copiam.

PARA. IN NONVM

& horum oleorum singula per se niue refrigerata, ab alto capiti istillabunt, et æger paulo ante cōmemorata victus ratiōe cibabitur. Odorabit vero camphoram, aquam rosaceā, salices, violas, & quæ his refrigerandi facultate respondent. Quod si post horum vsum morbus plurimum inualuerit increueritq, sumito opij & camphoræ singulorum pondus duorum granorum hordei, ac oleo salicū læuigata, auribus & naribus immittito.

Ex pituita.

Porro si graui capitis dolori nihil eorū, quæ de ruboris suffusione dixi in facie, aut oculis conspiciatur, morbusq in vetustatem protractus fuerit, inter initia leuioribus purgantibus auxilijs tentatis, venter catapotijs coccijs a grani (quod Græci κόκκον appellāt) magnitudine sic vocatis, ducēdus est. Quorum compositionem ipse in hunc modū institui. Pulueris picræ drachmæ decem, cucurbitæ syluestris drachmæ tres cum scrupulo, scammonij drachmæ duæ cum semisse, Turbit, stichados singulorū drachmę quicq, rediguntur hæc in catapotia, quæ decem di

Nim ē 2.
ithymali
pē.

stinctis vicibus in robustissimis corporib⁹

pot

R H A Z A E DE MOR. C V R. 77

porriguntur, cæteris autem pro viriūm ratione. ¶ Quoniam autem præsens compositio, propositi noni libri commentatoribus inspecta est, existimantibus interpretem loco duorum scrupulorum cum semisse scammonij, vertisse drachmas duas & semissem, huic loco Galeni compositionem catapotiorum ex aloë, interscribendam putavi. Habet autē ea libro primo secundum locos in hunc modum. Cucurbitæ sylvestris pars vna, aloes & scammonij, singulorum duæ. His ego, scribit Galenus, absinthij succi partem vnā admisceo, antea vero mastichen quoq; chiā, et bdellū indidi. Sic etiam Quintus utebatur, Galenus & Alexander cotoneorum succo hæc excipiunt, Paulus aqua, Oribasius brassicæ succo. Ac quia huiuscemodi catapotia instar grani ciceris finguntur, a multis coccia quoq; appellata sunt. Dantur Galeno & Paulo vndecim, Alexandro quindecim. ¶ Post deiectam autem aluum, capiti oleū sambuci & glandis vnguentarię infundendum, idem auribus quoq; & naribus immittendū est. Ad hæc ergo odoris gratia confectio

Alia tamen
Me. & Ni.

I. galliæ

P A R A . I N N O N V M

¶ *Parini
sunt ex o
riente ad
nos adue
cti.*

¶ galliæ moschata appellata, naribus obijcienda, & moschus narium foraminib⁹ inspirandus est. Cæterum si malum multum incrudescat, molestetq[;], sumito euphorbii et castorei vtriusque sesquibulum, & in olei sambuci momento solutum, naribus & auribus instillato. In vehemēti capitis dolore, qui cum æstu est, emplastrum infra scriptū, capiti & fronti utiliter applicabis. Emplastrum ad ingentē capitis ferūdū cruciatum. Accipito lactucarū semen, glaucii preparati succum, ¶ lignum quod sandalum appellamus, & rubrum, & album, nucē Indicam, rosas, opij momentum, his aceto & rosarum aqua conspersis, ac maceratis, informato emplastrū, & fronti superinducto, deinceps illi conduplicatā fasciā, aceto & rosacea aqua imbutā, superposito, eaq[;] exiccata rursus aliam huiusmodi refrigerātī liquori intinctam, illigato. Linimentū discutiens & digerens, ad dolorem qui cū frigore est, efficax. Castorei, euphorbii, piperis, sinapis, styracis, rutæ, marubii singulorū equæ portiones, hæc exiccata, & in puluerē subacta,

¶ *Veteribus inco
gnitum.*

RHAPSAE DE MOR. CVR .11.

acta, & per cribrum secreta cōmisceto, atq̃
illis vino veteri conspersis, informato pastil-
los ad solem exiccandos, ac quādo vsus po-
stulauerit, vno illorum vino veteri, aut oleo
costino chamemelinoue detrīto, frōtē et tē-
pora idētīdē ilīnīto. Vel vnū ī minori liquo-
ris portione dissolue, ac instar emplastri frō-
ti subīnde inducito. Hoc enim linīmētum,
seu emplastrum, oī vetusto capītis dolori est
q̃ accommodatissimum, nō modo frontī ac
temporibus admotum, sed etiam ī aurem
quoq̃ inditū, præsertīm si in aliquo iā com-
prehensorum oleorum dissolutus pastillus
fuerit. Aegrotanti vero vinum vehemēs ac
vetus, circa malī declīnationē, non tamen as-
satīm præbeto. Cēterum quando īgens ca-
pītis dolor, septīmanam totam perdurans,
hominem affligit, ī laconicum primā bala-
nei domum, aut balnea aquarum medica-
mentosarum exiccandī vī præditarum, æ-
ger deducendus est, ac capiti infundenda a-
qua, ī qua chamemelum, & sampsuchus, &
stichas Arabica seu Gallica, & serpillum,
simul omnia, aut singula per se ebullierint.
Porro

P A R A. I N N O N V M . 9.

Ob vetricu-
li vitiū.

Porro si caput indies ante cibum indoluerit, ac post ingestos cibos conualuerit, laboranti, ante tempus, quo corripi consuevit, succurrendum est, exhibendo panis offulas, succo mali punici, aut immaturæ vugæ, aut alijs virtute his paribus, immerfas.

Ex isolatu.

Si dolor capitis ob diutinam in sole morā, concitatus fuerit, huic facile aceto & rosaceo bene refrigeratis, subuenire poteris. at si dolor his nō remittitur, alijs intensius refrigerantibus propellendus est. Quod si præterea ingens capitis dolor perseverat, ac intenditur, neq; ullis præsidijs cedit, sitq; metus ægrum visu priuatum iri ob fluxum humorum in oculos, arteriæ, quæ per tempora repunt, opportune iuciduntur, ac manuali arte laqueis interseptæ, euelluntur. Verum postremum illud præter præsentis libri institutum, hoc in loco tractatur.

In fine .23.
methodi &
apud Paulū
l. 6. ca. 4.

De uertigine quam Græci *σκότωμα* uocant

Caput .ii.

A sanguinis copia.

Cum alicui ea quæ foris sunt, in gyrum circumagi videntur, & oculi tenebris obrut

R H A Z AE DE MOR. CVR. .9.

obruuntur, & concidere æger vult, quumq;
eodem tempore, quo scilicet malo egrotus
tenetur, facies & oculi rubore suffusi sūt, ac
venæ post aures reptantes sanguine turgide
cernuntur, eas tum incidere cucurbitulasq;
collo & tibis agglutinare expedit. Cæterū
si hæ venæ inconspicue lateant, faciesque ru-
bore suffundatur, ex axillari sanguis minu-
endus, & cucurbitulæ tibis affigendæ sunt.
In vtrisque autem his vertiginis speciebus
iam cōmemoratis, ad repellendum humorū
affluxum, capiti rosaceum cum aceto est in-
fundendū. Ventrem vero myrobalanorum
citrinarum decocto, superius ad capitis do-
lorem inscripto, deicere vtile est. Porro
quum neque faciei oculorumque rubor, neq;
febris, vertiginosis adsunt, perpendendum
est, an ne oris vētriculi eversio, an nausea ho-
minem infestet. Quæ si ægotanti affuerit,
primū vomitum leniter irritato, deinde quā-
ritatem coccis catapotis præcedenti capite
descriptam præbero, & a frigidioribus ac
pituitam coaceruantibus cibis ægotantem
arceto. Verū si neq; oris vētriculi subuer-

Galeni
arterias
tersecat.

Ob
machiv
tium.

Ex pro-
pria cere-
bri pitui-
ta.

B

fio,

PARA. IN NONNUM

Ho, neque cibi fastidium adsint, nullæq; caloris notæ appareant, alium subinde catas potius coccijs soluito. Cibos ad hæc frigidos omnino egrū auersari iubeto, & gargarizationē, quæ eliciendę pituitę sit, preparato. Naribus itē portionem aliquam inscribendorum ad attonitum morbum, vt struthij puluerē inspirato, quo caput & calefacias, & sterutationes frites. Nec inutiliter quoque ad eundem usum, caput excalefacientibus vnctionibus vteris.

¶ De phrenitide. Caput. iiii.

¶ Paul⁹ &
Alex. acu-
ta habēt.

Q Vando febris 3^a continens homoto-
nos agrum *in*uadit, vna cum vehe-
menti capitis & oculorum gravitate præte-
rea si multus rubor faciei & oculorū, & dor-
lor distendens capitis, & horror quidam lu-
cis, pulsusque solito velocior ac frequentior
adsuerint, phrenitidis futurę certissima in-
dicia adesse iudicabuntur. Si autem ad hæc
lingua aspera & nigra, vel suppallida fiat,
perturbeturq; adeo intellectus, vt æger mē-
te alienetur & deliret, multisq; vigilijs ex-
crucietur, phrenitis perfecta putabitur. Aegro

RHAAE DE MOR.CVR.

101

gro itaque priusq; enarrata illa symptoma-
ta omnia concurrant, venæ sectione, ac ven-
tris solutione, ex fructuum videlicet myro-
balanorum, tamarindorum & prunorum
succo succurrendum est. Alimentum autem
eius, sit aqua cum hordeo elixa, eaque semel,
aut bis in die propinata, pro consuetudine,
quam dum sanus esset, habuit. Capiti quidē
acetum cum rosaceo ab alto, ad compescen-
dum humorum impetum, infundatur. Cete-
rum si ægrotantem crebræ vigiliæ vrgent,
sumito violarum exiccatarum, corticum pa-
paueris albi, hordei corticibus liberi, semi-
nis lactucarum, radicum mandragoræ, sin-
gulorum tantum quantum manu vna ap-
prehendere potes, & simul in ænea olla quæ
aqua impleueris, tantisper dum aqua rube-
scat, decoquito. Deinde aquam iam tepidam
capiti instillato, & sit caput ad peluim, in
quam aqua recipiatur, inclinatum. Item
deinceps huiuscemodi decoctum, in æneo va-
se ad ignem modice recalefactum capiti su-
perfundito. Hoc sane singulis diebus crebro
factum, magnum leuamentum egro adfert.

Vt pluri-
mū ex sa-
gui, in tes-
tui meā
8c.

B ii Caput

P A R A. I N N O N V M

Rō. mittē
ti sangui
nis.

Caput præterea oleo violaceo muliebri lacte contemperato, irrigandum, quo etiam lana mollis imbuta, capiti applicanda est.

Porro si ægri vires inter morbi initia valide constantesque esse conspiciantur, sanguis protinus e cubito mitti debet, & is copiosior. At si manum desipiens non porrigat, metusque sit secundum vacuationē sanguinis profluuij, recta in frōte vena diuisa, vna vice quod satis est auferemus. Si vero vires languide dissolutæque sint, aliam curandi rationē, qua morbum depellamus, aggrediemur.

¶ De apoplexia. Cap. iiii.

SI aliquis ueluti sopore oppressus decumbit, & sine somno naturali stertit, cumq; pungitur non sentit, certum est eum apoplexia teneri. Est sane huius morbi magnitudo estimanda, secundum quod fortiter, aut debiliter stertit et respirat æger. Quum itaq; illi ob summam spirandi difficultatem, spuma ab ore prorumpit, nullis remedijs ipsi subueniri potest. Verum si leniter stertit, et liberius æger respirat, morbus lenior mitiorq;

orq̃ existit. Præsens quidē affectus, aut mor̃
opressum iugulat perimitq̃, aut solutus, in
neruorum resolutionem desinit. Quo circa
his symptomatibus ægrotantem affligenti-
bus, considerandum est, an ægri facies mula-
tum, aut cruenta, aut liuida, aut subuîridis
fieri incipiat, vti euenire solet, sanguine in mē-
bro aliquo vinculis, aut quauis constrictione
retento. Siquidem tunc sanguinem ilico ex
duabus venis iugularibus, aut duabus hu-
meralibus incisis, minuere opportunum est.

A sangui-
nis copia

Porro si ad hunc modum res se non ha-
beat, sed dum æger aërem inspirat, auditur
in thoracis, & asperæ arteriæ capacitate aë-
ris sonitus & murmur, tum hic clyster vti-
liter ei infundetur. Accipit autem, cucurbi-
tæ sylvestris, cyclaminis, centaurij minoris,
alterius cyclaminis speciei, hellebori albi si-
gulorum tantum quantum manu vna com-
prehendere potes, omniaq̃ simul trib⁹ libris
aquæ, ad duarum consumptionem decoquū-
tur, deinde per colum transfunduntur, atque
ex huius decocti semilibra, clyster in anum
inducitur, qui si cito ab ano elapsus fuerit, rur-

A pituita
to humo-
re.

Acrisim
fusio

sum

PARA. IN NONVM.

sus repetit⁹, ac donec humorum copia una
 cum eo clystere deijciatur, infunditur. Nari-
 bus adhuc struthium, & veratrum albū de-
 tritum, leni spiritu crebrius inspiretur. Est
 præterea ore per vim aperto conandum, vt a-
 nacardinam confectionem cum mulla, per
 os ad ventriculum subinde argum degluti-
 re procuremus, atq; eius negotij singulis di-
 ebus sollicitudo habenda est. Medicamenti
 autem pondus erit sesquidrachma potui ob-
 lata. descriptio vero eius medicaminis capi-
 te de neruorum resolutione habetur. Fri-
 xorium quoque ferreum candens, capiti
 identidem tam prope adiuuendum, vt ca-
 pilli etiam ægroti aduri videantur. Cæterū
 si his rationibus affectus non discutitur, in
 medicādo maiorem operam nauabimus. et
 enim caput rademus, & sinapi trito, & ca-
 storeo acetosq; acerrimo, oblinemus. In
 priori quidem propositi affectus specie, post
 detractum sanguinem fortiter brachia in-
 tercipere iuvat, inijciendo scilicet vincula
 brachiorum parti, qua cum scoptulis illis
 articulatio est, similiter & tibiarum partes
gra

graciliores vinciri ex usu est. Quinetiam ad reprimendum sanguinis affluxum, qui huius affectus autor esse consuevit, caput rosaceo oleo & aceto ex vino preparato, perfundere prestat. Preterea venam, ad sanguinis reuulsionem, in pedibus secare, deinde diruendi gratia, eam quæ in narium extremo apparet, incidere conducit.

¶ De † lethargo .Cap. v.

SI quis cum profunda animi in somnū delatione faciet, & tamen si vrgeatur sentit & mouetur, verum oculos semper oclusos habet, quos tamen si alius illi inclamatur, aperit, atq; ilico sopore oppressus ocludit, is lethargo phrenitidis contrario vitio laborat. Quem affectum clysteribus acerbis, supra capite de apoplexia descriptis, curare profuerit. Ori quoq; laborantis mulsā infundenda, quam vī per fauces dimittat, sollicitare oportet. Siquidem ea ægro alimentū loco præbetur. Caput ad hæc tribus primis diebus, aceto cum rosaceo irrigabitur. Verū post tertium diē sternutatiōes, struthij et veratri albi puluere inspirato irritabimur.

Caput

† Alij suo
beth, alibi
sopore i-
terptatur

Paul. &
Alex. in
lethar. fe-
cāt uenā.

PARA. IN NONVM

Ex pitu.
cerebrū
abuente.
Caput quoq; non inutiliter rademus, & si
napi cum aceto & castoreo perfricabimus.
Caro autem cum fere eandem ipse cum le-
thargo causam nanciscitur, eadem præsidia
accommodare expediet.

¶ De congelatis, quibus semper oculi in-
conniuentes manent. Cap. vi.

Ob refri-
geratū cor-
poris ha-
bitū.

Congelatum ac rigidum merito aliquē
iudicabimus, quum quasi in somnum
solutus decumbit, nec ab assidentibus inci-
tatus mouetur, & licet oculi patent, cilia ta-
men eius immota ac rigida permanēt. Sub-
ueniendū vero huic malo medicamentis le-
thargo, & graui somno dicatis. At præter
illa, oleum sambuceum capiti infundatur,
in cuius singulis libris, vncia euphorbi ad-
iecta sit. Præterea caput ipsum ex castoreo
& euphorbio in oleo sambuceo læuigatis,
illinatur.

A plani-
malis fa-
cultatis
ducto oc-
cupate.

¶ De nervorum resolutione, quæ παρὰ-
λυσίς dicitur. Cap. vii.

Quom alius ad motum omnino
impotēs est, ita vt vnum, aut plures
artus

RAZAE DE MOR. CVR. .13.

artus commouere minie queat, siq; vna ipso-
rum sensus abolitus fuerit, illum resolutione
vnius, plurimumue artuum tentari pronuncia-
mus. Huius quidem mali curationem cata-
potiorum foetidorum a me compositorum
oblatione, auspicabimur. Ea accipiunt pulue-
ris hierę picrę drachmas decē, syluestris cu-
cubitę carnis interioris drachmas quinq;
euphorbię drachmas duas cum semisse, casto-
rei, piperis, succi Cyrenaici, sagapeni, opopa-
nacis, ꝓ thapsię Indicę, sinapis singulorum
drachmam vnam, centaurii minoris, succi cu-
cumeris agrestis vtriusq; drachmas quinq;
gummi rute succo diluitur, quo alia excepta
in catapotia digeruntur, quę decem dosib;
exhibenda sunt. Quorum vna portione de-
uorata ꝓ triduum a medicaminum vsu æger
conquiescet, ac eo tempore cicerum deco-
cto, & oleo, & sinapi enutrietur. Postea alte-
ram dosim assumat, huic vbi tertia successerit,
aliquantulo temporis interuallo ad vires
recolligendas, a medicamentorum vsu æger
abstineat. Cibi conueniunt speciebus calis-
dis, & incidētibus seminibus cōditi ac præ-
para

ꝓ Seitaras
gi Mar. ꝓ
ter. lepidi
on.

ꝓ Aliqui
3. hebdo
mada s
scribi vo-
lunt.

PARA. IN NONVM.

parati, cuius notæ est piper, & huic caliditas
 te paria, & caro minutim concisa, & in frixo
 rio frixa, vel alioqui alij ad cōcoctiōem ex
 pediti, nec recrementicij. Potius autem mul
 ti sit. Iam membra quoq; resoluta, oleo co
 stino vtiliter inunguntur. Quod recipit, co
 sti vnciam vnā, piperis, pyrethri, euphorbii,
 singulorum tertiam vnus vncie partē, casto
 rei semunciam, oīa in semilibra † olei violæ
 luteæ, quæ antiquis parietibus incresecit, aut
 olei narcissi læuigant, atq; ita mēbris defi
 cientibus inuncta, multū iuuant. Porro die
 bus singulis, quibus a catapotiorū supra de
 scriptorū vsu, æger liber est, exhibēdæ sunt
 drachmæ duæ subsequētis confectiōis, quā
 ab anacardi cuiusdā arboris Indicæ fructu,
 anacardinā appellāt. Zingiberis, pyrethri,
 nigellæ, piperis nigri, piperis lōgi, seminis
 petroselini Macedonici singulorū drachmæ
 viginti, myrrhæ, rutæ siccæ, liquoris Cyrenai
 ci, aristolochiæ, baccarū lauri, castorei, thapsiæ
 Indicæ, sinapis, gētianæ, singulorū drach. v.
 anacardorū in aqua maceratorū cremoris, q
 ob pollentem dulcedinē, mel anacardinum
 dicit

† Al. cher
 ua. i. ricini
 fructis.

RHAZAE DE MOR. CVR. 14.

dictur, drachmas. v. irrorentur omnia oleo
 nucū, & melle decoctio ac despumato excipi
 antur. Medicamē hoc nervorum resolutiōi,
 apoplexiæ, oris contorsioni, tremori, alphis
 tum albis, tum nigris, scorpionum ictibus,
 convulsioni, quæ humiditati fertur accepta,
 & in summa, omnibus frigidis affectibus,
 q̄ maxime accommodum censetur. Siquidē
 hoc medicamenti genus, statim atq; duorū
 denariorum quantitate deuoratum est, sudo
 res elicit, febrimq; sua mirifica calefaciendi
 potentia, ægro conciliat. Verū si forte pro
 pinatum, egrotantē sanitati non restituerit,
 ab oī medicamine ipsum abstinere, ex usu e
 rit, interim tñ victus ratione (quæ cū studio
 adhiberi debet) exacte instituta. Deinde rur
 sus viribus recollectis, ad malī curationem Ab exte
 nacā.
 properabimus. Ceterū si resolutio ex pla
 ga, aut casu ab alto, aut incidente quopiā cor
 pore, subito facta sit, oī curationis spe adem
 pta, affectus (utpote nervo, aut musculo, aut
 tendōe per trāsuersum disrupto) incurabilis
 pmanebit. Si vero nō subito malum ex his
 causis excitatum sit, sed processu temporis
 paula

PARA. IN NONVM

paulatim & pedetentim augeatur, tum loco læso emplastrum hoc adhibeatur, quod recipit, farinā scenogræci, glandē vnguentariā, nucleos ceraforū syluestriū, & domesticorū, semen ricini fruticis, bdellium, ammoniacum, adipem anatis, ceram, oleum lilij, & simul omnia contusa & commista, in formam emplastri rediguntur, quod læsæ parti inducitur.

¶ De stupore ac tremore. Cap. viii.

Stupor,
frigidus
succo.

SI quis aliquod suorum membrorum ita affectum sentit, ut sæpe pedes nostri afficiuntur dum obstupeſcunt, partem eam stupore implicitam affirmamus. Quoniam autem dispositio hæc si longius prorogatur, in resolutionem transit, eius curationem haud differemus. Subuenit itaque huic malo, plurimum, remedijs, & victus ratione nervorum resolutioni dicatis, priuatim vero costini olei inunctione. Verum si affectus inueterauerit, æger catapotijs foetidis purgabitur, & eius intemperies anacardini confectionis usu, rationeque victus calidiore & sicciore, ad temperiem

R H A Z A E DE MOR. CVR. 15.

periem reducetur. Ceterum tremori eisdē præsidijs, quibus stupori succurris, subueniendum est. At si ex liberaliori vini usu obortus is sit, æger sibi a vino temperabit. Similiter si ex aquæ e niue solutæ potu, in hunc affectum inciderit, ab ea quoq; abstinēbit, ac in laconicum primam balnei domum valde calefactam, quousq; sudor copiosus erūpat, properabit, aut balneis aquarū naturalium opportune vtetur, atq; crebro in sole vtiliter apricabitur.

Tremor,
ab eadem
cā s; mi-
nori.

¶ De oris distortionē Cap. ix.

ORis conuulsione aliquem affligi testamur, si quando illi os ad alterū latus contorquetur, & oculum ad quem illud conuellitur, occludere nequit, præterea si expirare iussus, flat⁹ ab altera tantū parte prorumpat effleturq;. Curationē vero eius alui deiectione per catapotiorū fœtidorum propinationem, aggrediemur, & cibum ægrotanti, & potū incidentē, ac calefacientē, vt capite de nervorum resolutione persecuti sumus, instituemus. Item indies mane priusquam cibum

Ob pitu,
ifarcionē

P A R A. I N. N O N V M

cibum æger capiat, ex sinapi & ſyrupo acetoſo, gargarizationē porrigemus. Et in tenebroſam domū deductio ægro, iubebimus, ut nucē myriſticam parte ea qua affectus eſt, ore retineat. Narib⁹ etiam ad irritandas ſternutationes, ſiruthium detritū inſpirabim⁹. Præterea oleo coſtino egri ceruicis vertebraſ & faciē, & frontē pungemus. Adhæc ſingulis dieb⁹ anacardiū cōfectiōis ſeſgdrachmā, nō inutiliter æger aſſumet. Quod ſi hiſ reſ medijs affectus nō cedit, ventris ſolutionē, ac plane eandem, cū iam comprehenſa, curationē repetemus. De ea porro oris cōuulſione, quę nō ſubito, ſed paulatī oritur, haud quāq̃ mihi ſermo eſt, ſiquidē huiuſcemodi nō niſi in pernicioſa phrenitide, aliſq̃ morbis acutis, morte iā imminēte, inuadit ægro tantē, atq̃ tūc ea ex ſiccitate originē ducit.

¶ De conuulſione, quam σπασμὸν

Græci uocant.

Cap. x.

C Vm cuiſpiam particula aliqua contracta ad ſuā conuelliſtur originē, ſiue quāplures ex inſtumentariis partibus ita afficiuntur, conuulſas eas eſſe iudicamus. Cōuulſio au

Non autem omnis, aut statim, aut peditentim apprehendit. Conuulsioni quidē subito exorienti, eadem curandi ratio, quam resolutionis ex usu esse præcepimus, adaptanda est. Priuatim tamen in hac, partim pluribus manuum frictionibus, partim frequentiori olei costini inunctione utimur. Quæ vero non repente inuadit, sed lente aridam & suauemque febrem, aut largas deiectiones, aut copiosum vomitum, aut ingens sanguinis profluvium, aut amue magnam inanitionem, aut ariditatem, subsequitur, mala est, atque ad curandum contumax conuulsio. Nihilominus qualiscūque sit morbus, eius tamen curam aggrediemur, ac egro hordei decoctum, & iuscula pingua, emollientiaque, & frumentaceas forbitiunculas administrabimus. Ac deinceps in aquæ tepentis solium, & grotantem deducemus, & egelido oleo violaceo, & oleo ex semine cucurbitæ domesticæ, nervorum maxime exortus conuulsione implicitos, inungemus. Præterea ut solio diutius immoretur, oleoque violaceo illinat, hortabimur, ac vinum modicum per aquam bibat, cibisque humidioribus sese enutriat.

De

Ex reple
tione.

Ex vacu
tate.

PARA. IN NONVM

¶ De morbo commitiali ἐπιληψία
dicto. Caput. xi.

Percussio
tium ali
cuiuspar
ticulæ,

Morbo sacro commitialiue quempiam
detentum testamur, quum in terram
subito cōcidit, ac quasi concussus cōuellitur;
sed ita vt principis aīæ facultatis noxa cōco
mitef. Qd si cū his idicijs oris spuma, pecu
liaris admodū huius mali nota, apparet, aut
vrina & stercus præter voluntatē excernun
tur, aut genitura prflouit, dispositio deterior
vehementiorque existimatur. Perro si ger
priusquam malo corripiatur, præsentit qua
si auram seu spiritum ex particula quapiam
sursum ferri, ac caput petere, vnde postea vi
ribus dissolutus cōcidat, necessū erit, simul
atque auram hanc subnasci sentiat, antequā
in terram collapsus conuellatur, vt eam par
tē a qua aura effertur, superius fortiter vin
culis intercipiat ac constringat, siquidem eo
pacto, reuertī accessionem prohibere consue
uimus. Conualecente itaque ab accessioni
bus ægro, viribusque recreatis, purgatione
ex catapotijs coccijs sollicitandus est, & pars
contagionem impartiens, sinapi, pipere, eu
phor

phorbio ac melle anacardino inungēda, tan-
tis per dum pustulæ oboriantur, & tenui sa-
nie plenę crepent, ac liquor in illis collectus
profluat. Nec cicatrice obducātur, donec qd-
quid in illis coaceruatum sit, promaneat, nā
hec huius affecti⁹ certissima curatio est. Po-
stremo etiam cucurbitulę cum modica cutis
incisione, parti consortij lege affectum infe-
renti affigantur. Si autem æger priusq̃
morbuseum inuadat, nauseam, vel vētriculi
erosionem, palpitatiōemq; patiatur, & dein
accessio subsequatur, sape vomitū porrectis
his, quę vomitibus ciendis sunt idonea, iri-
tabimur, quo facto, vt medicamen amarum
in potu frequenter sumat, hortabimur. Ven-
triculo quoq; emplastrum ex spica, rosis ru-
bris, mastiche & thuris cortice, vino odora-
to subactis, imponendum. Vniuersa autem
vici⁹ ratio, ægro talis præscribi debet, quæ
sit quamminime excrementitia, qualis est
tum caro in fruxorio frixa, & X profundio-
ribus vasis incocta, tum auis palatum den-
tatum habēs, Arabibus ; taguid appellata,
tum aliarum auium in collibus degentium

Ex stoma-
chi vitio:

X Manas. vi
tratis habet.
† Pl. li 10. c.
.44. diome-
deas huius
generis aues
uocare vide-
tur.

P A R A. I N N O N N V M

Ex cerebri
pituita.

& hoc dorum caro . Porro si ægro sensuum obfuscatio motricisque facultatis imbecillitas ac torpor superuenerint, nullaq; cōmemorata indicia adfuerint, laboranti catapotia coctia subinde sunt offerēda. Et cibos quoque incidentes ac extenuantes, e quorū numero ante dicti sunt, præbere competit. Gargarizatio ad hec, vt & sternutatiōes antea cōprehensis iritatę, eliciendę pluitę gratia, haud parum conferunt. Preinde naribus pæoniæ radicis puluis, atomorū instar contusus, inspirabitur. Cæterū si eger comitiali morbo affectus, faciem & oculos rubētes, venasque tumidas habeat, sanguinis ex vena maleolū interiorem perreptate extractio, strenue ei auxiliatur. Quinetiā exsuris, appositus cucurbitulis, sanguis nō inutiliter vacuabit, et caput opportune oleo rosaceo cum aëto irrigabitur. A vino vero, cepis, allio, sinapi, porris, apio, fabis, cānabi, & breuiter ab his quæ caput vaporem emittēdo grauant, ac implent, eger arcebitur.

Ex sanguinis copia,

Electuarium ad omnem morbum comitalem efficax. Pyrethri, seselis, stichados singulo

R H A Z A E D E M O R. C V R. .119.

gulum drachmæ decem, agarici drachmæ
quinque, cardamomi recentis & acuti acro
risque, & liquoris Cyrenæici præstantissimi,
aristolochiæ rotundæ singulorū sesquidrach
ma, exprimito ex scilla succum, ac eum equa
li mellis portione commixtum decoquito.

Hodie offi
cina assam,
foetida uo
cant.

illoq; simplicibus medicamentis exceptis,
formato electuarium, cuius, nucis auellanae i
star, cum liquore quopiam medicamentorū
vim ad caput dirigente, indies æger mane,
& tribus horis post frugalem coenam, assu
met, & a crassioribus cibis interim abstine
bit. Electuarium hoc omnibus morbi co
mitialis differentiis, probe auxiliatur, si mo
do vnam a G A L E N O descriptam exci
pias, quæ scilicet ex sanguine ducit originē,
cuius & nos iam supra meminimus. Huic
sine sanguinis primum ex vena anteriorem
maleolum perreptante missionem, deinde ex
axillari, presentaneum remediū adferre sæ
pe vidimus. Victus autē ratio hoc malo im
plicito, instituenda est, ex his quæ sanguinē
minuunt, atque refrigerant. Quocirca car
ne, vino, reliquisq; dulcibus abstinendum,

C ii & acido

P A R A. I N N O N V M

& acidorum fructuum succus ad debitā crassitudinem decoctus, loco potus porrigendus est. Itē capiti quoq; ea quæ refrigerandi vim possident, & alia quæ sanguinis impetū reprimunt, non inutiliter superaccommodabūt.

¶ De incubone, qui ἐφιάλτης Græce dicitur. Caput xii.

C Vm quis in somno ponderosum quiddam sibi incubere imaginatur, & vox eius supprimitur, aut incerta indiscretaque editur, incubone correptus dicitur. Cui malo mox per initia succurrendum est. Nam si diutius se progauerit, crebroq; eos per noctē opprimat, grauius aliquod nunciatur malum, vt apoplexia, infania, & morbus comitialis. Quæ enim comitiales interdii, eadem ephialtici dormientes noctu patiuntur. Proinde si sanguineo colore, uenisque turgidis, æger fuerit, ex malléoli vena sanguinē detrahemus, ac furræ cucurbitulas cum curis incisione, agglutinabimus. Præterea laborantem a vini potu, & dulcium ciborum esu (in primis ab his quæ copiosum sanguinem gignunt) dehortari commodum erit. Si no-

Ex sanguine.

int.

notę contrarię pſuitam indicantes adſueſ-
rint, aliu catapotſ cocciſ ducere, & ægro
viſtus rationem extenuantem, ac incidentē
inſtituere, vtile erit. Exerciſtia quoq; & in-
feriorum partium fricſiones, haud paruum
momentum ad huius morbi depulſionem
adſerunt.

¶ De melancholia. Caput. xiii.

SI alienę cogitationes abſq; euidentī cā-
ſaliquē occupauerint, & inter cætera ani-
mi pathemata, metus, mœſticia, odiumq; ho-
minum præualuerint, illi melancholię ini-
tium adeſſe aſſerimus. Cæterum quādo ma-
lum vſq; adeo inualuerit, vt quæ animo con-
cipit, proloquatur, & ſermonem, & opera-
tiones incoſtātes interturbatoſq; ædat, me-
lancholica quæ apparent ſigna, eam perfectā
eſſe fatentur. Quem itaq; huiuſcemodi vane
imaginationes, & metus, animiq; anguſtię
detinent, priuſquam increſcere, augereq;
cœperint, illi omnino ſubueniendū eſt, quo-
niam ſi hæc ſymptomata excreuerint, diſſi-
cilem, ac plane cōtumacem curationē admit-
tent. Quapropter ſi melancholię comites ſint

Cura eius
quæ per cō-
ſortium ſit.

ven

PARA. IN NONVM.

ventris cruciatus, inflatio, ineptus ac vitiat⁹
 color, praua concoctio, vomitus, ructusq; aci-
 di, flatuorum spirituum copia, & sputorū
 multitudo, curationem a venæ axillaris, aut
 eius quæ ab ea inter minimum digitum,
 & anularem sinistrae manus repit incisioe,
 auspicabimur. Et si sanguis effluens, ater
 crassusq; cernitur, multum sanguinis, sin au-
 tem tenuis, & boni coloris conspicitur, mi-
 nimum extrahendum est. Laborantem ve-
 ro, his quæ aluum leniunt & humectant, ex
 quorum genere iuscula ex carne hœdorum,
 & veruecum confecta sunt, nutrirī compe-
 tit, statimque in balneum dulcis aquæ (in
 quo tamen non diu desidebit) deducendus
 erit. Post hæc subsequenti decocto epithy-
 mi a me conscripto, prospere vteris. Habet
 autem se in hunc modum. Myrobalanorum
 Indicarum drachmæ decem, filiculæ (quam
 πολυπόδιον Græci vocant) drachmæ quinq;
 senæ drachmæ nouem, turbit drachmæ qua-
 tuor, stichados drachmæ decem, vuarum
 passarum ab acinis mūdatarum tantundē,
 epithymi Cretensis drachmæ decem, omnia
 excepto

RHAZAE DE MOR. CVR. .92.

excepto epithymo in tribus libris aquæ, ad
 sesquialbræ consumptionem, decoquito. his
 actis, adijcito epithymum, ac statim ab igne
 decoctum amoueto, & tâtisper dum refrige
 retur in eo epithymum madere finito, & il
 lis simul refrigeratis manibusq; contritis,
 ea percolato. Deinde sumito agarici scrupus
 los duos, aloës drachmam vnam, sacchari ses
 drachmam, hellebori nigri sesquiobolum,
 excipito hæc melle, aut & iuleb violato, infor
 matoq; catapotia, ac tribus horis ante deco
 ctii propinationem, pro virium robore por
 rigo, deinde præscriptum decoctum ægro
 tanti exhibeto. Postea ꝑ triduū totum eger
 ad vires recolligendas conquiescet, ac illis
 interpositis diebus, quibus a medicaminū
 vsu abstinēbit, paulo ante dictis aluū leniē
 tib⁹ cibis, enutriēdus est, & potui vinū tenue
 & lucidū, bñq; odorū præbendū. Dehinc rur
 sus æger cōmemorata rōe euacuādus ē. Quī
 etiā tertio q; et quarto interpositis interual
 lis p̄ inferiora huiuscemōi purgationē molie
 mur. Interī tñ egrot⁹ a bilē atrā gignētib⁹ co
 hibeat, cui⁹ generis caprarū magnæ caro ē,

† Aliq̄ hea
 bdomadas
 tres scribi
 volunt

P A R A. I N N O N V M

& ferina, & vaccina, & suilla, & sale condi-
ta caro, & caseus vetus, & fabæ, & in pri-
mis lenticula oleraque vniuersa humectan-
di vim nullam possidentia. fugiat quoque vi-
na crassa & nigra, exercitia & vigilias, caue
atque ne vel fame, vel siti excrucietur. Sed
his contraria tenue vinum, & frequentes
& diutinos somnos, illi iniungere competit.
Prospicendum etiam lieni his remedijs, quæ
in sequentibus, capite de tumescenti splen-
nis præsidijs, prosequemur. Similiter os quo-
que ventriculi corroborandum est medicamē-
tis his, quorum mentionē faciam vbi ad ven-
triculi affectus deuentum fuerit. Cum au-
tem nullum ex his, aut certe pauca, melācho-
liæ eueniunt, post phrenitidem vero, aut ca-
pitis ictum, aut diutinam in sole moram, ali-
quem occupauerit, mox inter initia sanguis
ex humerali vena eliciendus est, & capiti
iisdem præsidijs, quæ his affectibus proprie
dicata sunt, prospiciendū est. Ad hæc caput,
modice seruefacta aqua, irrigandum, & in-
super oleum rosaceum, aceto ex vino confe-
cto dilutum, ab alto superfundendum. Simi-
liter

Ex proprio
cerebri affe-
ctu.

liter & lac muliebre capiti ægri immulgeri
prodest. Naribus quoque oleum seminum
cucurbitæ domesticæ, & muliebre lac recte in-
duntur. Quinetiam in balneum, humectan-
di facultatem possidens, subinde eger dedu-
cetur, & aqua tepens liberaliter capiti infu-
detur, & ægrotans omnia odora, frigida fa-
cultate prædita, crebro narib⁹ opportune ob-
ijciat. Ceterū si paulo ante dictorum me-
lancholiam nihil concomitetur, in prin-
cipio vena, quæ ex humerali & axillari me-
dia est, brahij dextræ, incidenda erit, & san-
guis præscripta ratione examinandus, atq; ea-
dem, qua diximus medicandi, & alendi ra-
tione, egro subueniendum. Posteaquam ve-
ro hæc auxilia tentaueris, aliquot diebus æ-
grum a medicaminū usu quiescere sines, &
deinde recollectis viribus, ut prius curatio-
nem, tantisper dum ab omni malo libere-
tur, aggredieris. Verū vniuersum studi-
um, quod in melancholicis considerandum
existit, eo spectat, ut pinguiore corpulenti-
oresq; crebris balneis potabilis aquæ, & vi-
ctu boni succi & humectante, & cum decē-
ti al

Veriq; a-
bigentis
curatio.

Trib⁹ me-
lā. specie
b⁹ coia.

P A R A. I N N O N V M.

ti animi delectatione reddantur, siquidē illi
 co, simul atq; pingues obesiq; redditi sunt, a
 proposita noxa liberantur. Proinde cibi illis
 q̄maxime idonei censentur, veruecina caro,
 hoedina, gallinacea, & panis similagineus,
 nam furturaccus, nulla ratione n̄s aptus uti-
 lisue putatur. Vinum autem conuenit tenue
 ac pellucidum, quoniam crassius nigrumq;
 illis ineptum est. Præter hæc, lac etiam recen-
 ter emulctum & adhuc tepens his confert,
 similiter & saxatiles pisces recentes, & selsa
 ma saccharo atq; amygdalino oleo p̄parata.
 Ad hæc cantilenas, mimosq; ridicularū rerū
 eos audire, & alias res præ oculis habere, q̄
 bus maxime capiūtur exhilarantq;, et multi
 somni, hoc morbo correptis, p̄sidio sunt.
 Contra ex graui & frequenti cogitatione, so-
 litudine vigilijsq; multis, graues illis noxæ
 nascuntur. Catapotia bilem atrā purgan-
 tia, quæ decoctum paulo ante descriptum ob
 nauseam respuentibus, porriguntur. Epithy-
 mi Cretensis drachmæ viginti, filiculæ (quā
 Græci πολυπόδιον vocant) agarici, vtriusq;
 drachmæ decem, hellebori nigri, drachmæ
 quinque

RHAZAE DEMOR. CVR. .22.

quinque, ꝛ sacchari tantundem, stichados drachmæ septē, pulueris hieræ picræ drachmę quindecim, finguntur ex his catapotia, & offeruntur eorum drachmæ tres, vel minus pro viriū ratione. Cæterum diebus, quibus a medicamentis æger liber quiescit, electuarij exhilarans inscripti, portionem opportune assumet. Hoc accipit, melisse, corticum citri, caryophylorum, galliæ moschatæ, mastiches, croci Orientalis, cinnamomi, nucis myristicę, cardamomi, pęonię, ³been albi & rubri, zedoariæ, daronici ꝛ seminis ocimi maioris, seminis ocimi caryophilati

Sic Mar. nar. salcm Indicū interpret.

singulorum pares portiones, moschi quantū pendet decima pars denarij vni⁹, insuper sumito myrabalanos, chebulas numero viginti, & emblicas numero triginta. hæc cōterito, & in tribus libris aquæ ad duarū librarum euaporationē, cōcoquito, & p colū traicito, pcolato quidē iuri, adhicito mellis librā vnā, & deīn rursus decoquito, quousq; vniuersa aqua euaporatu absumat. postremo trib⁹ huius cocti mellis partib⁹, partē vnā prædicto & medicaminū ī puluerē detritorū, adhicito.

† Alii Gary. legūt.
ꝛ Incognitę veterib⁹ radices

Cum

PARA.IN NONVM

Cum autem vsus postulauerit, huius antido-
ti, nucis auellanae instar, offerro. Sane electua-
rium hoc, animi hilaritatem, coloris iucundi-
tatem ac amoenitatem, bonaeque concoctione
creat, adhuc canitiem quoque retardat.

¶ De distillatione, raucitate & grauedine.
Caput. xiiii.

Ab aëre
fri-cere
brū co m
primete.

legua. q.
deinde
humoribus
notatis
A

Cum aliquis post balnei vsum, aut ex-
ercitium, aut aliam quampiam occasio-
nem calefacientem, caput in aëre ambiente
frigidior, & ventis aquilonijs flātibus, des-
texerit, & inde naribus, & palato pruritus,
& titillatio, nimirum in spōgiosis ossibus,
& commotio, sternutationesque prouenerint,
adhibeat linteum calefactum capiti, & id tā-
tis per, dum calorem in profundū capitis pe-
netrare sentiat, relinquat. Deinde nigellam
naribus odoris gratia admoueatur, & eius eti-
am puluere, aut struthij nariū foraminibus
inspirato, sternutationes prouocet. Præterea
ne peccans humor in dorsalem medullā flu-
at, supinum decubitum vitet, multam quoque
ciborum ingestionem, præsertim vaporoso-
rum, ac vini potum fugiat, Quod si affe-
ctus

Cū calida
intēperie:

R H' A Z A E DE MOR. CVR. .23.

ctus, linteï excalefacti vsu, nihil remittat, sã
guinẽ, humerali vena secta, mittere, ac vètrẽ,
remedijs aluũ leniẽtib⁹ atq; molliẽtib⁹, du
cere expedit. Tale est subsequẽs decoctũ, qđ
tusse & thoracis asperitate correpto, aluicq;
solutione indigenti, potui datur. Accipit aut̃
sericas numero viginti, myxas triginta,
vuarum passarũ ab acinīs liberatarũ drach
mas decem, violarum exiccatarũ drachmas
quatuor, dulcis radicis a cortice liberæ, &
nonnihil contusæ drachmas quinq;, ficus ca
ricas decem, decoquũtur omnia trib⁹ libris
aquæ, ad duarum assumptionem, deinde per
colum trañciuntur, & in percolato hoc deco
cto cassiæ fistulæ drachmæ septem, mannæ
(quã antiqui mel aëriũ appellant) drach
mæ decem dissoluuntur. Ceterum si ne
q; venę humeralis incisio, neq; alui defectio
opem attulerint, & materia quoq; in thora
cem defluerit. Ad hæc si cum tussē febris
inestauerit, ilico vena axillari, aut ea quę ex
axillari & humerali mediã est, secta, sangui
nem mittes, & a carniũ & vini vsu, agrũ
arcebis. Itẽ qđiu ingens calor, tussisq; aspe

¶ Sic iu
bas & i
b. s. f. i. u.
pretor.

P A R A. I N N O N V M

ra & arida perseverauerint, potui porrigere
 hordei decoctum, aut iuleb violatum (Graecis
 iezulapon appellatum) quod ad hunc mo-
 dum conficitur. Violatum vnciae tres, in tri-
 bus sextarijs aquae per diem macerantur, ex-
 colataeque aquae, librae tres sacchari adiiciuntur.
 Verum calore se remittente, tussis quoque sicca in
 humidam versa, ut iam expuat, infra scriptum
 decoctum una cum iam narrato iuleb viola-
 to indies tantisper dum pectus expurgetur,
 & tussis ager liberetur, voxque pristinae clari-
 tati restituatur, propinatum, maximum auxi-
 lium praestat. Quod decoctum accipit, ficus
 caricae quinque, sericae decem, myxas viginti,
 vuarum passerarum albarum ab acinis murdatae
 drachmas decem, dulcis radicis cui cortex ab-
 latus sit drachmas quinque, omnia donec ta-
 buerint aquae incocta, per colum transiunt.
 Huius decocti quotidie vnciae tres, admixtis
 iuleb violati drachmis quinque porriguntur.
 Porro si inueterauerit tussis, molestaque esse
 prexerit, curationem eius, ut capite de tussis
 praesidijs persequar, aggredieris. Ceterum
 si defluxus humorum ad nares Latinis gra-
 uedo

RHAZAE DE MOR: CVR .24.

uedo. Græcis κόρυζα appellatus perseverauerit, suffutibus per infumibulum, aut calamū in naribus transmissis, cohibebitur. Proinde si humor, qui ad nares decumbit, tenuis, acris, mordax suppalidusq; extiterit, suffumigationem ex ꝑ sulphure aceto macerato posteaq; resiccato, tentabimus. Aut si libet, ex hordeo fabisue decorticatis acetoq; cōmaceratis, ac deinde exiccatis, aut ex saccharo cādidō, sandaloq; albo, suffitu prædicta ratiōe utemur. At si nullā caloris notam facies præse ferat, suffumina ex costo, vel thure apprabimus, nam & hæc fluxus reprimunt.

⚡ Legēdū
puto fur-
fure cum
Aui. non
sulph. cū
Mesue.

¶ De lippitudine, quæ ὀφθαλμία Græcis
uocatur. Cap. xv.

QVando adhærens oculi membrana, quæ natura alba est, ob sanguinis affluxum cruenta apparet, & ex oculis lachrymæ resudant, atque in maioribus oculi angulis sordes quædam colliguntur, egrum lippitudine infestari certum est. Quæ p symptomatū numero vehemētiaq; mō grauis, mō lenis existit. Verū inter huius vitij species, deterrima ea esse ferē, quæ oculorum
alba

P A R A. I N N O N V M

alba adeo inflata tumidaq; habet, vt nigredinem (quæ corneæ pars tota est, adherente membrana non obteſta) obtegere, palpebrasq; inuertere videatur. Mox itaq; per ophthalmiæ curationis initia, venam humeralem patienti oculo oppositam, in extrema manu pollicis vicinam, aut supra cubitum, secare iuuat, nisi leue malum fuerit, aut sanguinis fluxus cōstituerit. Siquidem tunc e directo partis læsæ, secta humeralis vena, opem fert. Quocirca q̃to vehementior affectus est, tanto maiorem sanguinis copiam deſtrahere decet. Post sanguinis autem detractiōem, alius myrobalaris citrinis, manna (veteribus mel aëriū appellata) & fructuum quorundā, vt prunorum tamarindorū deco, ducenda est. Aeger quidem a carne, vino & cibis dulcioribus arcendus, parcior quoq; victus illi præscribendus est. Quod si hæc inefficacia fuerint, collyrium album lacte mulieris puellā lactantis læuigatum, oculis illinetur. At si sordis multitudo in oculis collecta sit, specillo lana molli inuoluto, ac aquæ rosatæ immerso, oculum a suis sordib⁹ liberare cōpetit. Dehinc
pulis

RHAZAE DE MOR. CVR. .29:

pulvis albus in spargendus, oculisque mollis
 lana * muliebri lacte imbuta, cum laxa faci-
 cia (ne pulvis lachrymis eluatur) illigan-
 da est. Deinde oculis ita molliter astrictis,
 & agro in tenebrosam domū deducto, om-
 ni studio & conatu, somnum illi conciliabi-
 mus, summo opere quoque cauentes ne in affe-
 ctum oculum, aut capite depresso & inclina-
 to, decumbat. Sint itaque omnia capitis indu-
 menta laxiora, ac minus stricta, nec diu pro-
 nus, imo potius supinus, cubet. Porro si a
 venę sectione, atque alui defectione, oculus leui-
 or, & dolor eius sedatus, & tumor mollior,
 & lachrymę imminutę fuerint, balneū sub
 inde eger conscendat. Siquidem hoc, morbi
 reliquias dissipabit ac depellet. Ceterū hu-
 midis sordibus oculisque grauitate permanē-
 tibus, puluerem citrinū accommode oculo
 inspirabis. Ex horum remediorum gene-
 re, quod lippitudine vexatis multum condu-
 cit, etiam est linimentum subscriptum, epi-
 thematis instar frontis ac palpebris accomo-
 datum. Quod recipit. Glaucij preparati suc-
 ci, rosarum aloës, lycij, sandali rubri, nucis

* Huius fa-
 ctis narum
 apud Pit. li
 28, ca: 7.

D Indi

P A R A. I N N O N N V M

Indicæ, croci Oriētalīs singulorū equas portiones, ex quibus cibus inter se coriandri succo cōmixtis, fingunt collyria, & ubi vſus ex poſtulauerit, vnū illorum coriandri, aut intybi ſucco, aut roſacea aqua læuigatū, dictis iā partibus inungit. Hec remedio ſi eger vſus fuerit, ſuperis fauentibus, ſanitati reſtituet.

Collyriū albū, Ceruiſſę ablutæ drachmę decē, ſarcocollę craſſioris drachmæ tres, traga gathę drachma vna, opij ſedrachma, redigitur in collyria, lenticulæ inſtar. Pulvis citrinus, Sarcocollę craſſioris drachmæ decē, aloës drachmæ duę, croci tantundē, myrrhę drachma, lycij drachmæ duę, hiſ in pollinē ſubactis, ubi vſus erit, pulvis oculo inſpirabit. Pulvis albus, Sarcocolla alba & pinguis, lacte mulieris potiffimum iuencula macerata, in vmbra tantisper dum exiccetur, relinquatur, deinde exactiffime conteratur, & ſingulis eius pulueris drachmis decem, adijciantur glaucij ſucci drachmæ duę; hæc rursus detrita in puluerem tenuiſſimum reponuntur, poſtulanteque vſu, oculo inſparguntur.

De oculi

Abscessum oculo innatum praesagiunt, ingens & vehemens punctilis dolor, pulsuū magnitudo & vehemētia, multae p-
fluētes ab oculis lachrymae, & vnīuersus ocu-
lus, aut abhærescēs mēbrana sola, cruore suf-
fusa, quorū ruborē aptis oculis, aut inuersis
palpebris, intueri licet. Deinde in oculo vn⁹
locus altero sanguinolētior, aut in cornea cō-
spicua parte, locus aliq̄s alb⁹ apparens, ocu-
li quoq̄ abscessum indicant. Cæterū ad prę-
sentis affectus auxilia instituenda admoūē-
daq̄, Medico in oculorū ægritudinib⁹ pro-
fligandis exercitatissimo, & natura sagaci
opus est. Veruntñ nos curationis capita &
summā, atq̄ præcipuā medicaminū rationē,
prosequemur. Dicimus itaq̄ vlcera in cohæ-
rente membrana (quā oculi albū nōnulli ap-
pellāt) oborta, nō ita esse pñitiosa priculosa-
ue, vt sunt ea, quę corneę parti adnata mem-
brana nō obteçtę, innascunt̃. At omnium
perniciosissimū vlcus est, quod corneę e pu-
pillæ regione euenit, siquidē hoc vlcus pupil-
læ procidentia subsequi quā ocyslime solet.

D Huius

P A R A. I N N O N V M

*fr. flam. non
ad suppurā
tionis curatio.*

Huius itaque inflammationis curationem, a venę humeralis incisione, auspicabimur, sanguinis copiā quoad fieri poterit imminuentes, dein ad alui solutionē properabimus. Et eger a carnium, & vini dulcis usu, arcebis, solarumq; interī refrigeratiū herbarum esu, atque aquæ potu, contentus viuet. Oculo vero per initia, collyrium album muliebri lacte detritum, immittendum erit. Quod si modo pulsus minor & tardior fieri, cæteraque symptomata remitti videantur, spes est morbum sine suppuratione solutum iri. At si pulsus post detractum sanguinem, & deiectum ventrem, atque collyrii albi usū, neque minor, neq; remissior, neque rarior, redatur, exigua spes superest inflammationē illā, sine puris collectione, curari posse. Quare tunc oculo collyrium ex thure inducendū est, & ei puluinus aliquis ex molli lanula consarcinatus, atque ita admotus, illigandus est. Verum priusquam inflammatio suppurascet, oculum leniter ne dolore excrucietur, absque puluino constringere decet. Nec tunc quoque a collyrii ex thure usu abstinere com-
petit,

*si suppuran-
tis inflā. &
ulceris cura
est.*

RHAEDE MOR. CVR. .27.

petit, quoniam tantisper dum inflammatio
suppuretur, illud illinere confert. Pure vero
iam nato, collyrium ex plumbo, quousque ca-
uitas tota abscessus impleatur, vniuersaque ca-
ro regeneretur, quam conuenientissimum erit.
Hæc autem præsidia abscessu rupto, nec val-
de magno existente, opportune tentantur.
Nam si magnus pupillæque vicinus absces-
sus sit, operæ præciū erit, oculo Eleisier, mox
ad finem capitis subscribendum medicamē,
accomodare, ac eodem tempore puluinū quo
que ex tenera lana confectum, molliter oculo
alligare decet, ne vlceris occasione, pupilla
procidat. Proinde ad hæc, supinus decubi-
tus depresso non nihil capite, & a vehemen-
tiore motu oculi & quies, egro conueniūt.
Cæterum carne iam in abscessu ac vlceris lo-
co regenerata, vniuersaque cavitae imple-
ta, relinquetur in oculo alba quedā cicatrix,
que, si profundius vlcus fuerit, crassior, si ve-
ro in corneæ tantum superficie extiterit, te-
nuior superficiariaque erit. Cicatrix tamē il-
la seu callus, remoto vlcere a pupilla oculi, ni-
hil incommodi adferre potest. Sin autem pu-
pille

P A R A. I N N O N V M.

pillæ vicinior, post vlceris curationem, alba cicatrix relicta fuerit, vicinitatis ratione visionem abolebit. Quapropter tum illis præsidij, quibus albugines absterguntur solenturq; , vtendum erit. Collyrium ex thure. Ammoniæ, sarcocollæ vtriusq; drachmæ quinq; , thuris drachmæ decē, croci drachmæ duæ, omnia fœnogræci succo excepta, in collyria digeruntur. Collyrium de plumbo. Plumbi vsti & loti, stibij, pompholygis abluti, æris vsti, gummi Arabici, tragacanthæ singulorū drachmæ septem, opij sedrachma, hæc simul contrita per tenuissimum pannum sericum cernuntur, et puluere aqua pluuiali consperso, informantur ex eo collyria. Collyrium de perditam vlceris oculi carnem regenerans, & pupillæ procidentiam prohibens, & relictam cicatriceem seu callum extenuans abstergensq; , Cadmiæ ablutæ, pōpholygis loti, serussæ, stibij, thuris singulorum drachmæ duæ, myrrhæ drachma vna, sarcocollæ crassioris sesquidrachma, cinnabaris, aloës, opij singulorū drachma vna, formantur ex his collyria. Collyrium autem Eleifer

vocatū

vocatum, quo ex vlcere procidentiam pupillæ metuentes vrimur, in hūc modū se habet. Stribn̄, lapidis hematitis vtriusq; drachmę decem, acacię drachmę tres, aloës drachma vna, his cydoniorum nucleorum succo subactis informantur collyria, ac dum vsus expetit, oculo accommodantur.

¶ Ad ea quę oculis incidunt educenda.

Caput. xvii.

SI pilus, festuca, aut quid aliud oculo fortuito inciderit, sumito specillū resina pinea illitum, voluitoq; per oculum, et adtrahet id quod oculo illapsum est. Idē succinum attritu calefactū oculoq; admotum, præstat.

¶ De albugine oculo innata.

Caput. xviii.

QVæ oculis innascitur albugo, cicatrix est, post vlcera curationem, dum eorum continui solutio restituitur, relicta. Quę si in puerorum oculis oborietur, facillioris curę erit, q̄ in seniorum. Siquidē in senibus facta albugo, haudquaquam curationem admittit, nisi perquam tenuis & superficialis ac nubeculę instar extiterit.

Præ

P A R A . I N N O N V M

Præsentem porro affectum, præsidij his discuties. Postq̃ eger balneo corpus emolliente egressus fuerit, aut facie q̃minime prona, vaporem aquæ calidæ, aut fœnogræci tepentis decocti, tantisper dum ipsa rubeat, receperit, infra scripti pulveris portionem oculo insperges. At si id remedium venas turgidas ac sanguinolentas effecerit, doloremque inflammatorium concitauerit, ab eo conquiesces, donec hi affectus oculi remissi fuerint, dein idem subsidium repetes. Medicamentum præstantissimum albuginem probe detergens citiq̃ discutiens, quo ego in exterendis albuginibus, neq̃ efficacius, neq̃ generosius, aut ulli par comperi. Accipe massacumiæ (quod ex plumbo, vitro, silice conficitur, quo scilicet fictilia vasa illinuntur) halcyonij, qđ alij spumam maris vocant, stercoris magnæ lacertæ, nitri naturalis non facticij, sacchari albissimi singulorum pares portiones. dein sume acori, chelodonij ; vtriusq̃ drachmas decem, & decoque in libra vna aquæ, ad trium partium consumptionē, postea percollato, & hoc decocto comprehensas medicinas

subis

Aliqui ad
p̃ur fœnicu
hum.

RAZAE DE MOR. CVR. .29.

subigito, et liquore imbibito, in vmbra exiccandas seponito, ac denuo contritas, & vt prius asperfas exiccato, id vbi quater prestiteris, rursus omnia vt prius exiccato conteritoq; ac oculo puluerem inspargito. Siquidē hoc medicamen nulli in detergendis albuginibus, vt dixi, est secundum, nam crassiores albugines, etiam brutorum, vt equorum & boum oculis innatas extergit.

¶ De scabrie & tunicula. Caput. xix.

Cum palpebram inuersam interius ru-
bro colore suffusam, & asperam inae-
qualemq; aspexeris, scabie ea molestatur. Et
quando super oculorum alba & nigredinē,
quiddam tuniculae instar, venis multis crue-
tis & turgidis contextum cernis, affectus ad-
est, qui Arabibus a tunicae forma, sebel dici-
tur. Sane utraq; hec vitia graua sunt & diu-
turna, atq; ad curandum cotumacia. Nihilo-
minus tamen inter initia, dum aeger sanus
est, nec affectus inualuit, venae sectione bra-
chij & frontis, & alui solutione vtatur. Et
ab esu palmularum, & sesami melle prae-
parati, & temulentia abstineat. Praeterea vacuū
corpo

Ab ero-
dente hu-
more.

A suffu-
so sangui-
ne in ad-
haerente tu-
nica.

P A R A. I N N O N V M.

corpore, nec cibis dissentum ægrotantē, sub
inde ad balnea deducere, identidem quoque
laboranti oculo collyrium rubrum illinere,
profunt. Collyrium rubrum. Lapidis hæ-
matitis, æris floris cremati ac loti vtriusque
drachmæ tres, gris vsti drachmæ duæ, croci
drachma vna, myrrhæ tantundē, piperis lon-
gi sedrachma, posteaquam vino veteri ea le-
uigaueris, redigito in collyria. Præter ista col-
lyrium viride, capite de vnguī descriptum,
si illinatur, opem fert. Quod si morbi hi
in vetustatem proruperint, scabies, inuersa
palpebra & instrumento (quod a palpebra-
rum rasura *ελεφανόξιπτον* Græci appellant)
per summa dērasa, & tunica vero suppurati-
one, & concoquentiū vsu, persanari debent.
At horum curationem præsens libri me-
te, quum ad manualetn artē pertineat, haud
quaquam admittunt.

✶ Horū
curatio la-
tist. 4.
secundū
locos.

¶ Ad maiorum angulorū carunculas pru-
ritu uexatas. Caput. xx.

A morda-
ci succo.

S Vmito intybum tenellum ac vires, &
eo manibus exacte contrito, informato
globulos paruos instar oculi, & oleo viola-
ceo

RHAZAE DE MOR. CVR. .30.

geo circumlitos, ac oculis clausis superacco-
modatos, egrotanti somnum inituro, illiga-
to. Verum rosaceum proposito affectui ge-
nerosius est citiusque auxilium præstat. At
si hæc inualida fuerint, accipito lentes ex-
corticatas, rhum Syrenaicum, rosas rubras
& mali punici acinorum succum. hæc trita
sapa, hoc est decocto vino, conspargito, ac in
morem emplastri, pruriginoso angulo in-
ducito. Quod si ne hæc quidem suffecerint,
humeralem egrotantis venam primum inci-
dito, deinde eam, quæ recta in fronte repit,
ac eas, quæ ad maiores oculi angulos sunt.
Ventre quoque subinde medicaminibus
bilem flauam cientibus deſcito. Item egrum
identidem ad reprimendum humorum acri-
moniam in balnea dulcis aque deducito.

¶ De ungui oculorum, quod ὀφθαλμῖον

Græcis vocatur

Cap. xxi.

Q Vando aliquid mēbranulæ nervosæ
instar, ex angulo oculi nares spectan-
te oriri, & oculi albū obtegere, ac aduſq; ni-
gredinem eiusdem protendi cernitur, affe-
ctus unguis appellatus, oculo innascitur.

Ob eō
ſtrictis uel
expulſis
cis imbe-
cillitatē.

Huius

PARA. IN NONVM

Chirurgia apud
Aeri. l. 7.
capite 60.

Huius noxa tunc demum peior censetur, dū ad nigredinem quę e regione pupillę est, malum prorepserit. Hac itaq; membranula tenui existente, collyrio viridi, & collyrio ex æris flore, eam elidere tentandum est. Sed postquam in vetustatem & crassitiem vnguis deuenerit, scalpello ad id parato est euellendus. Collyrium viride, quod tuniculę sebel dictę, vngui & albę cicatrici auxilium præstat. Aeruginis drachmę tres, æris floris combusti drachmę sex, auripigmenti rubri, nitri, halcyonij singulorum drachma vna, salis ammoniaci drachma semissis, guttę ammoniaci drachmę duę, ammoniacum in rutę succo dissoluitur, et reliquis medicinis eo aspersis, informantur mirifice virtutis collyria, etiā si paulo vehementiora sint. Collyrium ex æris flore, quod vnguē exerit. Aeris cremati, æris floris vtriusque drachmę quinq; , æruginis drachmę duę, salis ammoniaci, nitri, auripigmenti (quod sublimatum vocant) singulorum drachma vna, conteruntur omnia, & septimanę spatulo, vt melius exiccantur, reponuntur, deinde

R H A Z AE DE MOR. C V R. .31.

De illis rutę succo conspersis, finguntur collyria, quibus vnguis affricatur.

¶ De uibice, ac cruentis suffusionibus ex ictu aliante causa. Caput. xxii.

Q Vando in oculo ex plaga, seu aliqua uis occasione, maculam sanguinolentam fieri contigerit, sanguis ibidem ex affluxu collectus (postquam ictus & fluxio conquieuerint) discutiendus est. Sumito itaq; auripigmenti rubri, thuris, myrrhæ, ammoniaci singulorum equas portiones, his hyssopi succo detritis, formato collyria, ac illa coriandri succo, aut hyssopi decoctio læuigata, oculo illinito. Verum q̄ diu dolor perseverauerit, albumen oui oleo rosaceo cōmisceto, & lanam teneram illis imbutam, oculo illigato. Etiam columbæ sanguinem ex teneris alis expressum, statim per initia opportune instillabis.

Vehemens multum

¶ Ad lachrymas. Caput. xxiii.

C Vm maiores oculorum angulos perpetuo humore fluentes conspexeris, & grum quotidie ieiunū, et corpore expurgato, ad balnea deducito, & oculo hæc subscriptū

A frigido humore affluxu.

puls

P A R A. I N. N O N V M.

puluerem, tenuitate atomis non abſiſſem, inſpargito. Puluis quidem iſte accipit, pompholygis drachmas decem, coralliꝝ rubri & albi myrobalani citrinæ & contritæ, aloës ſingulorum drachmas duas, piperis drachmā ſemiſſem, deterito hæc in pollinē tenuiſſimum, ac oculo crebro eum inſpirato.

¶ De viſus debilitate. Cap. xxiii.

Ex humi-
ditate.

SI cum viſus imbecillitate, manifeſtæ hu-
miditatis notæ apparuerint, quæ tem-
pore inediæ & exercitiꝝ nonnihil remitti vi-
deantur, catapotia coccia, leuioribus pur-
gantibus præſidijs tentatis, ſubinde egrotan-
ti porrigere, & alimēta ſiccantia & exte-
nuantia adminiſtrare oportebit. Vomitum
quoque ſubinde poſt aſſumptos cibos inci-
dentes irritare opportunum eſt. Oculis autē
pulueres ſiccandi vim poſſidentes, vtiliter
inſpargentur. Qued ſi ſam dictum aſſe-
ctum ſiccitas, corporiſq; macies concomitē-
tur, copioſius & humectans alimētum, &
vini potus, ex uſu erunt. Item aqua egelida
capiti liberaliter inſundenda, atq; ad teruide
aquæ vaporem, facies inclinanda eſt. Naſi
bus

Ex ſicci-
tate.

RHAZAE DE MOR. CVR .32.

bus at ac auribus, oleū amygdalarū dulcī
instillandum, ac oculis lac mulieris adolefcē
tule quotidie, idq; sepius est infundendum.
Hæc porro imbecilli visus species, famis tē
pore & vacua aluo, intērior quoq; redditur.

Compositio pulueris tenuissimī, visum
qui humiditatem suæ imbecillitatis causam
obtinēt, exacuens. Accipito pompholygis
rosacea aqua abluti siccatiq; drachmas vi
ginti, deinde exprimito sampsuchi virentis
succum, & nocte vna quousq; resideat, quie
scat, dein eū percolato, & eo succo aspersū pō
pholygem, donec exiccetur seponito, postea
q; conterito, & sumito zingiberis, piperis
nigri, piperis longi, chelidonij singulorum
drachmas duas, salis ammoniaci drachmā
vnā, pompholygis sic vt descripsi prepara
ti, drachmas viginti, hæc omnia conterito,
& succo virentis foeniculi aspargito, & rur
sus siccata ac contrita reponito, & exposcen
te vsu, oculis iniiciens, vtire. Præter ista quo
que proposito affectui, collyrium ex fellibus
illitum optime facit, sed valde acre & mor
dax est.

Puluis ad
humidita
tē oculi.

Ad

P' A' R' A' I' N' N' O' N' V' M

¶ Ad palpebrarum tumorem, Græcis *χρῆμα* *μοσιν* appellatum. Caput. xxv.

A sanguinis influ-
xu.

fo. 15. §

Oculo epithema humorum affuxum reprimēs, capite de oculi lippitudine descriptum, illinito.

¶ Ad palpebrarum pilos, oculos irritantes. Caput. xxvi.

Ob fici-
tatem aut
pororum
obliquita-
tem,

Si pilus vnus alterue oculo infestus fue-
rit, alijs rectis palpebrarum pilis, masti-
che, aut oleo sesamino, agglutinato, aut radi-
citus eos euellito, ac locum, a quo euulseris,
mucronato ferro, aut acu, vr̃ito. Verū si mul-
ti pilī oculū iritauerint, necessitas tarsū præ-
scindere cogit. Ceterum eius nequeñ tracia-
tio, nostri propositi libri limites transcēdit.

¶ De suffusione, siue humorum in oculum as-
fluxu. Caput. xxvii.

Qvandoque ante oculos culices ali-
cui, vel alia tenuia, lucentia, caligi-
nosaeque corpuscula perperam obuersari vi-
dentur. Quod nonnunquam proprię noxæ
oculi, nonnunquam ventriculī affectui, fer-
tur acceptum. Quare inter hæc duo discri-
men habendum est, neque sane hoc sympto-

ma homines infestans, parui pendendum ē,
quod si ob ventriculi vitium euenerit, non me-
tuendum, ne oculo magnam noxam adferat.
Sin ex proprio oculi affectu sit, metu graui-
oris mali non caret, siquidem id suffusionis
initium esse consueuit. Cæterum affectus hic,
dum recens est, nondumque radices egit, lo-
calibus medicamentis eliditur. At ubi ve-
tustus perfectusque extiterit, sola punctori
styli mucronis pertusione, curari potest, licet
fortasse nec pertusio quidem opem adlatura
sit. Quam ob causam inter hæc duo iam es-
narrata, merito discrimem summo studio in-
quirendum est, quod autem id sit perstringā.
Cum igitur vtrique oculo, muscæ, aut culi-
ces, aut quid simile occurfare videatur, pro-
certo habendum, ex affectu ventriculi malū
pendere. Si aut altero tantū oculo huiuscemo-
di apparitiones conspiciantur, vitium oculo
propriū esse iudicatur. Sic etiam quando
cibis distenso ventriculo, & eo ingesta male
concoquente, nauseaque laborante, solito plu-
res cerni videantur, tempore vero inediae,
aut exercitij pauciores hallucinationes eue-

Paul. li. 6.
ca. 21.

E nianē

PARA. IN NONVM

niant, & tunc quoq; sciendum est, ab ere vetriculi affectum pēdere, idq; maxime si duobus tribusue, aut etiam pluribus mensibus suffusionis apparuerint accidentia, contemplantiq; tibi pupillam nihil tenebrosum conspiciatur. Dum itaq; harum coniecturarum congeriem congereris, & ueluti chorus quidam concinne loquatur, catapotia coecia porrigito, quibus si affectus in totum extirpatur, prædictis notis indicationibusque fidem dabis. Cæterum si altero tantum oculo visa fuerint, & singulis dieb⁹ perpetuo huiuscemodi apparitio perseverauerit, nullo scilicet die interueniente, qui omni reprehensione caruerit, censendum est suffusionis (quam aquam alij vocant) adesse initia, præsertim si altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut (ut breuiter dicam) non exacte pura videtur, quæ si ita se habeant, certo certius est suffusionem esse. Quando itaque affectus hic ex propria dispositione oculi pēdet, prohibendum ægro ne cucurbitulis, neq; ex venis in manum distributis, sanguinem extrahat, similiter quoq;, ut piscium, & co

rū

Mallex
oculi ui
tio cura
tio.

RHAZAE DE MOR. CVR. .34.

dū quæ humectant, pituitosūq; succū gene-
rant, esum fugiat hortaberis. Alium ve-
ro frequenter catapotijs coctijs deſicies & æ-
grotum calefacientibus siccantibusq; ales, at
q; hydromel potui illi propinabis. Oculis
vero collyrium ex fellibus opportune illi-
nes. Collyrium ex fellibus, quod auxiliatur
incipienti suffusioni, & pupillę dilatationi,
& his, qui post occasum solis non vident, &
hebetudini viſus, humiditatem ſui occasione
habentibus, hac ratione conficies. Fellis
gruis, fellis piſcis Arabibus ꝑ sabot dicti,
fellis hircini, fellis accipitris, fellis aquilę, fel-
lis perdiciſ ſingulorū ſiccorū vnū, aut plura,
horū aridorū drachmīs decē, adiſcies euphor-
bię, ſylueſtris cucurbitę, ſagapeni ſingulorū
drachmā vnā, hiſ ſimul omnibus attritis &
vna commixtis, aſperges ſcœniculi tenelli &
virentis ſuccū, & poſcente vſu cum lacte mu-
liebri, aut oui candido, oculo immittes.

In initio Pati-
luset Aeti-
venā ſecant.

• Nos facit
viemur, Ca-
queq; callo-
nym. i menū
nit.

¶ Ad nocturnam cæcitudinem, quæ νυκταλωψ

Græcis dicitur.

Caput. xxviii.

ab aquet hu-
moris & ſpi-
ritum craſ-
ſius.

Hic affectui idoneū eſt, hepar caprinū
ſciſſū & ſectionibꝫ ſigulis iiectū piper

E ii longū

P A R A. I N N O N V M

longum, & eisdē sectionibus occlusis, in cli-
banum hepar mittitur, & tantisper dum as-
setur exicceturque, non tamen vratur, relin-
quitur, quo assato, piper longum extractum,
diligenter cum moschi momento cōteritur,
ac sanie, quæ ex asso iecore resudauit, cōspar-
gitur, & exiccatum in pulueremque detris-
tum, oculo insufflatur. Iam quoque ipsum ie-
cur opportune edendum porrigitur. Aut ca-
prillum fel melli commixtum, in æneo vase
super ignem decoquito, & dein specillā felli
intinctū, oculo admoveo, magis tñ profece-
ris, si collyrium ex fellibus oculo inūxeris.
Porro si hæc omnia inefficacia fuerint, alutū
deijcito, ac sanguinem ex utrisque humera-
rijs, & frontis vena, detrahito, victusque ra-
tionem extenuato.

¶ De dilatatione pupillæ. Ca. xxix.

A siccitate.

Cum pupilla hoc est foramē, quod pro-
pter vueā tunicam perforatā in nigre-
dine oculi cernitur, vsq; adeo dilatatur ac pa-
tescit, vt omni ex parte alba oculi attingat,
& si id post vehementem capitis dolorē eue-
nerit, modica eius restitutionis spes habenda
est,

RHAZAE DE MOR. CVR. .35.

est. Exigua autem existente dilatatione, vñ- Ab humoris
copia.
trem catapotijs coccijs deſciet, ac identidem
collyrium ex fellibus oculo illines. Cæ-
terum si pupillam propter ictum dilatari ob-
tigerit, haud quaſq; formidandum, quia, nisi
vnea tunica diuulsa sit, pristinae integritati
restituetur. Parabis itaq; ad huiuscemodi vi-
tium, emplastrum ex fabarum farina, chamæ-
melo & althæa, & hæc in vino & aqua con-
tusa, oculo induces.

¶ De fistulis maioribus oculi angulis acciden-
tibus. Caput. xxx.

SI quando angulus maior madet, cumq; A putri & e-
rodente hu-
more.
scomprimitur, sanies & pus emanant, fi-
stula ægrum molestat, cui ignito ferro præ-
sentissime succurritur. Verum eius vsum Apud Cel. li
5. ca. 28.
docere, ab huius libri tractatione alienū cen-
setur. Nihilominus tamen subiungam re-
medium, quod si accommodaueris, ipsam re-
sudationem per mēses plures ita cōprimes,
vt æger conualuisse sibi videatur. Medica-
men hoc accipit, Aloës, thuris, sarcocollę, a-
luminis singulorum pares portiones, erugi-
nis quantum pendet quarta pars vnus, hæc
crita

PARA. IN NONVM

erita, ac plantaginis succo subacta, in collyria redigantur. Cum autem vsus expetit, fistulam donec vniuersa sanies in ea coaceruata profluxerit, premito, deinde ægro in latus sanum, fistuleque non obnoxium, decumbente, iam descripti collyrii in succo plantaginis dissoluti, tres guttas, aut quatuor, non tamen simul, sed vnâ post aliam, iusto interposito intervallo, in magni oculi angulum, fistula tentatum, infillato. Quo peracto, æger trium horarum spatio, prædicta figura decumbet. In aurora insecti diei, rursus fistulam exacte comprimito, ac eandem curationem reiterato, atque deinde septimana vna, aut quam diu fistula pressa refudat, idem repetito. Siquidem hac curatione, locus fistula infestatus, siccus ad longum tempus seruabitur. De oculorum autem præsiidijs, quantum præsens institutum exigit, iam satis pertractatum existimo. Reliqua vero quum ad curationes, quæ ferro, ac manus administratione peraguntur, pertinent, relinquam, quoniam multas remedijs, atq; longa pertractatione

Falsissime li.
4. c. c. d. n. d. m.
Fecit Galeni

RHAZAE DEMORCVR. 33.

tionem, opus habent. Sunt tamen nonnulla ex horum genere, in his libris, quibus de decoctione, & facis, tuendaque sanitate egimus, descripta.

¶ De aurium dolore. Caput. xxxi.

SI aurium dolorem, faciei inflammatio pulsusque magnus & velox concomitentur, sanguinem, ex humerali vena secta, egrotanti detrahit. Item oleum rosaceum oleumque de floribus salicum, modice ad auris sensum calentia, cum aceti pauxillulo, in auditorium meatum infundito. Lac quoque ita caalidum, uti est recenter emulsum, subinde cum oui candido, auri instillato. Ventrem autem myrobalanis citrinis, scammonio, & aloë, vehementer ducito. Preparabis autem huiusmodi medicamen, in hunc modum. Sumito myrobalanorum citrinarum drachmas viginti, & in pulverem contritas, duabus libris aque usque ad duarum librarum vni⁹ tertiarum consumptionem incogito, deinde decoctum per colu trañcito. Insuper accipito aloës drachmam vnā, scammonij obolū vnū, hec discoctio cydoniorum succo aspsa, atque i caraporia digesta porri

Ex infla-
matione
tractio.

PARA. IN NONVM

porrigito, & deinde post duarū horarū inters-
 capedine decoctū p̄beto. Quod si dolor mi-
 nime conquiescens vrget, opij momentum,
 oleo rosaceo temperatum, auri immittito.
 Et si pulsus priori similis redierit, triduoq;
 talis perseverauerit, oleū ex sesami semine,
 in quo anatis, aut gallinę adeps dissolutus fu-
 erit, subinde sensim auri infundito. Siquidē
 tunc auri abscessus inest, cui suppuratiōe o-
 pus est. Quando autem dolor sedatus fuerit,
 suppurationem perfectā esse scito, & subitam
 insperatamq; ab aure puris profusionē exspe-
 ctato. Ceterum dum dolor aurī, post fa-
 stidiosam repletionem, aut ventos frigidos,
 molestauerit, oleum in quo ruta cepaue in-
 cocta est, tepidum auri immittito. Quod si
 hoc inualidum fuerit, oleū in quo turbis de-
 coctum sit, auditorio meatui instillato. Aut
 oleum liliorum, cui ad singulas uncias, eu-
 phorbij recentis & castorei vtriusque drach-
 ma vna exactissime leuigata, adiecta sit, in-
 fusum non minus iuuat. Porro si ne hoc qui-
 dem auxilium prestititerit, aluū catapotijs coc-
 cijs ducito, & laconicum primā balnei par-
 tem

crassis ui-
 scosisq; hu-
 moribus.

RAZAE DE MOR. CVR. 37.

tem (in quo sudorē prouocet) intrare iubeto. Vinum similiter vetus robustumq; illi ppi nato. Si vero aurium dolori adsint sonit⁹, tinnitus et flatus, panicū siue miliū in frīxorio torrefactum, identidem feruidum per sacculos, superaccommodato. Aures quoq; ægri ad vaporem aquæ, cui mentastrum, stichas Arabica & sampsuch⁹ incocta sint, inclinato. Ad hæc castorei & euphorbiæ vtri⁹q; pondus quatuor granorum hordei, sambuci oleo dissolutum, & deinde auri infusum, magnum adfert præsidium.

Ex flatu
oso spiri-
tu.

¶ De auris ulcere. Caput. xxxii.

PVre ab aure profluente, mulsa tepida crebro in vno die infundenda est, dein de infra scriptum hoc medicamen, præsentī affectui multum accommodum, est inijciendum. Sarcocollæ, aloës, cinnabaris, thuris singulorum drachma semissis, squamæ ferri, æruginis, vtri⁹q; obolus, omnia aceto leuigata, in aurem infunduntur. Vel linimentum tortile ex linteo, melle imbutum, ac dicto iā liquori intinctum, in aurem mittitur. Aeger quoque tantisper hoc medicamine, & mulsa,

PARA. IN NONVM

sa, dum auris curetur, opportune vti poterit.

¶ De sonitu & tinnitu aurium.

Capit. xxxiii.

Nonnunquam hoc vitium ob exquisi-
tum auditus sensum, et usque acrimo-
niam oboritur, cuius certissimum indicium
putatur, si tempore inedia increuerit, cra-
pula vero & repletionis remissior fuerit.

Hic igitur affectus, cum lentior sit, sibi de-
dicatam curationem nullam exposcit, nisi
forte aggrauescat. Tum enim opij grana
duo oleo rosaceo soluta, ac in aurem dimisi-
sa, illi (sensu nonnihil stupefacto) abunde

Ex euapo-
ratu crudi
humoris.

auxiliantur. Si vero capitis grauitatem, &
auditus imbecillitatem sibi comites sortitus
fuerit, oleum seminis raphani, & oleum a-
mygdalarum amararum, & oleum rosace-
um, in quo castoreum fuerit detritum, audi-
tus meatui instillabis. Arem quoque ad va-
porem aquæ, cui sampsuchus, stichas Arabi-
ca, absinthium, mentastrum & organum inco-
cta sint, opportune inclinabis. Et aluum ca-
rapotiis cocciis deijcies, & vinum ægrotan-
ti subtrahes, parceque ales.

Ad

¶ Ad gravem auditum. Cap. xxxiiii.

CVM autem auditus grauitas, hominem occupat, perpendendum est, an in aure sordes (quas a consistentia ceram nominant) coaceruatae sunt. Quoniam huiusmodi sordibus ibidem inueteratis, pharmacis mihi supra ad auris vlcera narratis, aut nitro in aceto subacto, aut manuali opera expurgabuntur.

Verum si non sint sordibus infecta, & auditus grauitas post copiosam ciborum ingestionem, aut morbum acutum, humores ad aurem in eius indicatione protrudentem, oborta sit, aure vaporem aquae, cui paulo ante dicta incocta sint, recipies, idque per infumibulum, quo totus vapor in aurem penetret. Curabis autem id rectissime ad hunc modum.

Mentastrum, absinthium, sampsuchum, ali-
aque ante iam commemorata, in aenea olla
aqua plena, & ad hunc usum idonea, ore scilicet
angustiore decoquito, ac deinde infumibulum
ollae ori accommodato, & ne vapor ex-
halet, linteis infumibulum, & olle os circum-
uoluto, ac deinceps aurem super infumibu-
li ori

A crudis
humoribus.

P A R A. I N N O N V M

li orificium inclinato. Præterea collyrium hoc auditorio meatui instillato. Sylvestris cucurbitæ drachma vna, nitri scrupulum vnū, castorei, aristolochiæ rotundæ, succi absinthij singulorum drachma semissis, costî sesquibolus, euphorbiî obolus, fellis vaccini quantum ad simplicia excipienda. Itæ est, imformato ex his collyria, et cū vsus exigat, vnum oleo amygdalarum amararum detritum, auripedetentim, ac continue infundito. Hoc enim præstantissimum adfert præsidium doli, qui ex pituita & flatulētis spiritibus ē, & sibilo, & rinnitui, surditatiq; qui affectus omnes, viscosorum crudorumque humorum soboles sunt. Porro si auditus grauitas post ieiunia, crebrasq; vigilias oboriatur, & fuerit facies emaciata, & oculi concaui, eger balneum dulcis aquæ petat, & copiosiori potu, ac cibo humectante vtatur, somnosq; plures sibi conciliet. Caput quoq; aqua tepida cum oleo humectandi vim obtinente, donec sanescat, perfundat. Quod si a phrenitide hoc genus vitij inuaserit, præsidij capite de aurium sonitu descriptis curatur.

Ex siccitate

ab expurgato humore pericrisim

Ad au

R H A Z A E D E M O R. C V R. .39.

¶ Ad aurium vermes, & animalcula auditus
meatum irrepentia. Caput. xxxv.

C Vm auditorium meatū titillatio, pruritus & dolor molestant, & vermes inde excidunt, auri mentastri succus, aut foliorum persicorum, aut oleum nucleorum malorum persicorum, aut aloem succo absinthij detritam, auri immitte, hæc namque vermes, & animalcula aurem irrepentia, aut in viceribus nata, interimunt.

¶ Ad ea quæ in meatum auditorium incidunt, euellenda. Caput. xxxvi.

Q Vando aliquod meatui auditorio infigitur, oleum tepidum illi infundito, & ægrum in balneum potabilis aquæ deducito, atq; in eo tantisper dum mollius corpus eius reddatur, immorari finito. Deinde naribus struthium in puluerem subactum, inspirato, aëremq; per inspirationem attractum, donec sternutatio iritetur, egrotantem retinere iubeto, huiusmodi namq; cōcussu fortasse id qd' meatui illapsum est, eicietur. Si vero maius fuerit, q̄ quod excidere possit, forpicula, aut ferro instar retusi hami in aurē
dimis

PARA. IN NONVM

demisso, operæ precium est extrahere. Quin etiam idem quoq; in naribus, si vsus expe-
rit, tentandum est. Porro si in porum audi-
torium aqua defluerit, capite versus eā par-
tem, in qua patiens auris est, inclinato, in v-
no pede subsiliat æger. Quod si non excer-
nitur, sternutationem vt præcepi, prouoca-
to, deinde tepidum oleum subinde auri in-
stillato. Neque hoc malum parum nos anxi-
os reddere debet, præcipue si id quod in aurē
inciderit, aut ingressū sit, tetra qualitate pol-
let. Inde enim grauis cruciatus subsequi, &
in aure inflammata si intus maneat, conuul-
siones adferri solēt.

¶ Ad sanguinem e naribus erumpentem.

Caput. xxxvii.

EX eorum genere, quæ sanguinis e nari-
bus profluum sicut, est succus ocimi
maioris, in quo camphora leuigata sit, & na-
ribus ita immixtus. Auxiliatur enim huiusce-
modi succus hoc affectu implicari solitis, aut
ante fluxum sanguinis, aut tempore proflu-
us naribus illitus. Vel accipito gypsum, ci-
nerem chartæ ex linteis præparatæ, galliā,
cinnā

R H A Z AE DE MOR. CVR. .40.

cinnabarim, calcē viuā, chalcithidē, et hęc si-
mul in puluerem detrita, naribus inspirato.
Vel linimentum tortile ex linteo, his pulue-
ribus albumine oui exceptis, imbutum, nari-
bus immittito. Aut alumen scissile in pulue-
rem longe tenuissimum actum, cum pari por-
tione amyli, naribus insufflato. Quod si co-
piose sanguis profluere perferuerat, brachiorū
partes axillis vicinas, zonis, aut cordulis vin-
cito. Quinetiam vt sanguinem in contrariū
trahas, foemora quoq; ac testes vinculis iterā
cipito. Porro si affectus inualeseat, incisa hu-
merali, partis illius vnde sanguis profluit,
sanguinem per interualla modice detrahare,
confert. Si quidem nec hac ratione sistitur,
magnas cucurbitulas ignitas hipochondrijs,
ea parte qua sanguis fluit, affigere, cutemq; si
opus sit, leniter incidere, consilium est. Me-
dicamen sistendo sanguini longe efficacissi-
mum. Accipies calcem albam, qua aurisabri
vti cōsueuerē, & subinde tritā citra cūctatio-
nē naribus inspirabis, vel linimentum funi-
culare oui candido liquore illitum, eaq; cal-
ce imbutum, narium foraminib⁹ immittes.

Ad

PARA. IN NONVM

Ob mate-
ria adusti-
onē.

¶ Ad narium crustas & ulcera. Ca. xxxviii.
CRustis, quas Græci *ῥοχαλας* uocant, in
naribus obortis, ceram & oleum hu-
meftans, cuiusmodi violaceum est, & galli-
naceum adipem illines, atq; ægri naribus
crebro, diebus aliquot, aquę calidæ, cui emol-
lientia, & humeſtantia incocta ſint, vapore
mane obijcies. Cæterum crustis iam emolli-
tis ac prolabi incipientibus, linimentū tor-
tile aceto acerrimo ſale cōtemperato intin-
ctum, naſo inferes, ac crustis ipsis acetū cum
ſale ſuperaccommodabis, ſiquidem eo aceto
exiccatae, diutius naribus non inhærebunt.
Quod ſi vlcera ibidem oboriantur, vnguen-
to ceruſſæ opportune ea reſtitues.

A materi-
æ affluxu
& cōcoc.
& expul.
imbecilli-
tate.

¶ De polypo & ſarcomate. Caput. xl.
CUm parte interiore narium, caro ſuper-
flua, mollis, & quaſi laxa & rubra ala-
baue innafcitur, & nares quoq; craſſeſcere
incipiunt, iamq; dicta carne impleri, hume-
ralē venam primum incidere iuuat, deinde
linimentum tortile vnguento viridi imbu-
tum, naribus impoſitum bene facit, eius au-
tem vnguētī libro ſeptimo Almanſori dedi-
cato,

RHAZAE DE MOR.CVR. .41.

cato capite septimo de carnem exedentibus
remedijs, memini. Constat autem, ærugi-
nis & despumati mellis vtriusq; vncia. quib-
us nonnulli addunt sarcocollæ drachmam
semissem, & ammoniaci tantundem, quæ v-
na cum ærugine, melle & aceto excipiunt,
atque in formam vnguenti digerunt. Ve-
rū si hoc non vsq; adeo efficax fuerit, * me-
dicamen mordax ibidem a me descriptum,
tantisper dum plane locus expurgatus ex-
suscipit fuerit, parti laboranti inducetur. Præ-
terea affectui huic nōnunquam ferro, excin-
dendo radicitus carunculam illam succurri-
tur. At medici id tentantes, interdum graui-
ter delinquant, ac egrū, affectus differentiā
non perpendentes, in magnum vitium indu-
cunt. Nam in naribus quoq; cancer subinde
nasci solet, quem sine discrimine cum poly-
po confundunt. Quum itaq; hoc in loco obor-
tus cancer, neq; mordacia fert medicamina,
neq; quæ ferro sit præcisionem, consiliū est,
leniter illum attrahere, & præsidijs lenien-
tibus, & sanguinis missione, & alui solutiōe
ipsum tollere. Cognoscitur vero, an huiusce-

* Melleze
beregí Ara-
uocant.

P A R A. I N N O N V M.

modi affectus, cancer sit, ex eo videlicet, si durus est, & venas tumidas habet, & ad palatum vsq; nonnunq; proripit. Proinde naribus siccis durisq; existentibus, ac nullo ab illis manante humore, sumopere cauendum est, ne cancer, aut huic similis affectus, ferro acrius medicamentis iritetur. Verum si, quæ naribus caro innascitur, laxa mollisq; fuerit, & humores e naribus profluxerint, ac si pressus nasus, mollem, nec tactu durum sese offerat, non metuendum est, quin acrium medicaminum vsu, & ferro subueniri illi possit.

¶ De obliuiscia olfaciendi facultate.

Caput. xl.

Ob frigidū
hu. organis
olfactus ipa-
ctum.

Q Vando sensus, quo odores per sentimus, deperditus est, & naribus nulla superflua caro increuit, & aer solito more per nares attrahitur, & oculi sensuumq; reliquorum organa, naturalibus munijs apte funguntur, naribus puluerem tenuissimum ex struthio, † cyclamine & sale ammoniaco, inspirabis. Aegro quoque, ut nares vaporibus exalefacti aceti admoveat, præcipies. Verum si hæc inefficacia sint, subsequens medi-

di

† alias artemi-
sia.

dicamen naribus illinetur. Cuius compositio in hunc modum se habet. Nigellæ, fellis gruis, cucurbitæ syluestris, veratri albi singulorum pares portiones, hæc detrita in puluerem, ꝑ̄ vrina cameli Arabici, quantum ad contegendas medicinas sat est, excipiuntur, deinde ad solem exiccanda reposita, tandem in pastillos lentium instar, digeruntur, exigente autem vsu, vnus illorum oleo sampsiachi solutus, naribus induendus est. Siquis-
dam hoc remedium, præfeti affectui est aptissimum. Quod si hoc medicamentum suo calore & mordaci facultate, magnum dolorem excitauerit, oleum seminum cucurbitæ domesticæ, narium foraminibus inunges, & capiti aquam calidam liberaliter infundes. Sorbitiones quoque actu calidæ & humectantes, agro conducunt, ex quorum numero sunt prislana, & fursurum decoctum, eaque quæ farina & alijs frumentaceis seminibus, præparantur. Et subsequens quidem præsidium ad deperditum olfactum efficacissimum putatur, quod in hunc modum conficies. Cõterito nigellam in puluerem tenuissimam

Eius vsum
docet Pli. lib.
28. Ca. 8.

PARA. IN NONVM.

*x. g. l. deins
u mento elo
vius. c. q.*

& cum veteri oleo subigito, deinde acri ca-
pite (ore aqua impleto) quantum licet retror-
sum reclinato, comprehensi medicaminis ali-
quot guttas naribus instillato, & laborantē
quoad potest, aërem ambientē attrahere præ-
cipito, hocq; tribus insequentibus diebus &
ternis vicibus facito. Cæterum si ob medica-
menti acrimoniam, rostitio aliqua concitetur,
ea quæ prius dolori vtilia præcepi, naribus
admouebis.

*Exinflama-
tione.*

¶ De dentium & gingivarū dolore. Ca. xli.

SI contingat gingiuam vna cum dentis
dum dolore cruentam simul & tumidam,
& rubro colore suffusā esse, tumereq; tumore
pulsatili, cucurbitulis scoptulis, aut infe-
riori mandibulæ affixis, sanguinem detrahi-
to, prius tamen secta humerali vena. Deinde
de ore aliquādiu acetum cum rosaceo, donec
tepuerit, retinendum præbeto, quo eiecto,
idem rursus repetat, ac postea solum rosace-
um frigidum ore retineat. Verum si ea ra-
tione affectus non sopiatur, sitq; cum inflā-
matione pulsus vehemens, camphoram vna
cum pyrethro contritam, dentium radicibus
ad

RHAZAEDE MOR. CVR. 143.

gingiuas applicato, & postquam pulvis defluxerit, a saliuarū elutus fuerit, alium secundo diligenter inspargito. Præterea lanā mollem oleo rosaceo imbutam, denti applicato. Quod si dolor non remissus aliquando incrudescit, grauiorq; redditur, opij obolū rosaceo læuigato, & illo circumlitam lanulam quamminime sordidam, radici affecti dentis adhibeto. Si ne sic quidem dolor requieuerit, gingiuis scalpello leniter incisis, sanguisugas admoueto. Porro si gingiua, neq; cruenta, neq; tumida sit, neq; pulsatili dolore infestetur, & facies absq; inflammatione cernatur, sed dolor a nausea, & copiosa ciborum ingestione, & cœna ægrum inuaserit, ægerq; multis cibis refrigerantibus usus fuerit, aluum catapotijs coccijs deijcito. Et dolore affectorum dentium radices, subscripto medicamine circumlinito. Quod accipit, pyrethrum, sinapi, thapsiam Indicam, nitrum, piper & zingiber, quibus in puluerem detritis, dentium radices infricabis. Lanam quoque tenellam illis inuolutam, dentium finibus circa gingiuas apponito, prius

Ex frigidi
humoris af-
fluxu.

tamen

P A R A. I N N O N V M

ramen ore, aceto in quo pyrethrum, menta-
strum, & origanum ebullierint, abluto. Ex-
trinsecus autem panicum, siue milium in
frixorio tostum sacculoq; insutum, gentis ac-
commodato, aut piperis puluere melle sub-
acto, dentem eiusq; radicem infricato. At si
hæc inualida fuerint, dentium finibus, hæc
theriacam superponito. Castorei, laserpithi,
hoc est succi Cyrenfici, piperis, gingiberis,
styracis, opij singulorum pares portiones,
hæc melle leuigata, denti inducito. Aeger
quoque ad tempus a cibo abstinebit, & sub
inde laconicum primam balnei partem, vt
sudor copiosus erumpat, ingreditur. Si au-
tem nec sic dolor sedatus sit, ferro candenti
dentium radices subinde contingito, vel pe-
nitius extirpato. At erosionem tentato denti,
medicamenta sequentia, vt quæ vehemen-
ter exedant, imponito, aut in totum den-
tem euellito.

Ob præstan-
tiā ab auto-
re theriaca
appellatur.

Medicamenta eradicantia & confringen-
tia dentes. Caput. xlii.

¶ alias cōstri-
git.

Medicamen qd' exeso denti immissum,
ipsius remittit dolorē, ac ipsam ꝑcō-
minuit.

RHAZAEDE MOR.CVR. 44.

minuit. Sumito; herbam lactariam foeminā
 (quam Græci τριφυλλον μυρτίτην vocant) &
 piper, his commisce cedri resinam, dentiq;
 excavato imposito. Medicamen imbecillos
 ac dolentes dentes eradicans. Accipito ra-
 dices mori, radices capparis, pyrethrum, lac-
 tithymali, liquorem volubilis maioris (qui
 Græcis κισσαμπιλον dicitur) cucurbitæ syl-
 vestris radicem, & auripigmentum ru-
 brū, & his tritis, acetum quantum vt inter
 se cohæreant satis est, inspargito. Et acetum
 quoq; vnus hebdomadæ spatio (vt exacte
 conglutinentur pulueres) singulis diebus
 pari modo, vt prius, adijcito. Deinde den-
 tes circumquaque scalpello rasos, prædicto
 pulvere decies in die, donec facile mouean-
 tur, diligenter illinito, eaq; ratione extrahi-
 to. Aut plussculis diebus dentem foæce aceti
 acerrimi, madefacito, vt mobilē postea extir-
 pes. Vel fluuiatiles ⁊ ranas, oleo tatisper dū
 marcescant, incoquito, & exigente vlu, den-
 tes prius tamen circumcisos, huiuscemodi o-
 leo illinito, ac sic dentes laxatos, instrumen-
 to ad id parato, eradicato.

⁊ Nonnulli
 KebeKegira
 nūculū iter
 prætur.

⁊ Potius a
 depressanz vt
 ridis i arbori
 bus degens

Ad re

PARA. IN NONVM

¶ Ad refractionem & stuporem dentium.

Caput. xliii.

Hic affectui portulaca & amygdala amara, vel quę viribus his respondent, commanducata, auxilium præstant. Sal quoque si eo perfricetur, aut cera commasticetur, non parum iuuant.

¶ Ad dentes, qui frigidi contactu indolescunt.

Caput. xliiii.

Oleum excalefactum linteoque exceptum, admoueto, aut oui vitellum assum, aut calentem panem masticandum porrigito, aut balsamo oleoue iridis, dentes affricato.

¶ De linguae orisque superficialijs ulceribus.

Caput. xlv.

Si vlcera sanguinolenta sint, accipito rosarum seminis, amyli, cinerule, lentium excorticatarum, seminis senæ ex Mecha, singulorum pares portiones, camphorę pauxillum, his in puluerẽ subactis aphthas affricato. Præterea eadem quoque aceto cum rosaceo oleo, & rosacea aqua excepta, ore retinenda præbeto, sanguinemque cucurbitulis scopulis & faucibus a foris affixis, minuito.

At si

albican

A sanguine.

RHATÆ DE MOR.CVR. .45.

albicantes papulæ sint, sale & melle illinito,
& syrupum acidum vocatum, aut muriam,
ad oris collutionem porrigito.

¶ De gingiuis sanguine humentibus.

Caput, xlii.

AD gingiuas sanguine tenuiore perpe-
tuo fluētes sanandas, accipito auripig-
mēti rubri & citrini, calcis, gallarum imma-
turarum, aluminis singulorum pares portio-
nes, his in puluerem subactis, & aceto pera-
cri exceptis, informato pastillos exiguos, &
vbi vsus exigit, eorum obolum sumito, eoq;
adamussim detricto, gīgiuas infricato, ac po-
stq; liquor ille gingiuis aliquandiu adhæse-
rit, rosaceum oleum ægro retinendum præbe-
to. Est enim id præsentī affectui, tum putre-
dini, & herpeti exedenti, qui os infestari con-
suevit, remediū præsentissimū.

¶ De laxatione procidentiaue gurguli
onis.

Caput, xlii.

CVM ægro radici linguæ, aut faucibus
videtur quippiam incumbere, & quan-
do os adaperit, seu linguam exerit, eius gar-
gareo laxatus elongatusque propendere con-
spici

Columella.

P A R A . I N N O N N V M

Scribō
eius loco
gallā con-
tusam ha-
bet,
Vua.

 spicitur, sumito compositionem ramech ab
 Arabibus vocatam, in quam gallæ immatu-
 ræ, & vuę passę ingrediuntur, deinde accipi-
 to salē ammoniacū, ac ea in tenuissimū pul-
 uerem simul redacta, instrumento ad hoc a-
 pto, super columellam inspirato, atq; huius
 instrumēti mucroni narrati pulueris momē-
 to appposito, ad columellæ radicem sensim cō-
 tingendam instrumentum dirigit, columel-
 lamq; eo pauxillum foras attrahito. Id au-
 tem instrumenti genus ab vua attollenda
 σαφυλίπαρτορ dicitur. Aut si voles ex malo
 punico acido, vna cum sua carne cōtrito, gar-
 garizationes parato. Ceterum si diutius
 ita producta propenderit, ipsiusque pars su-
 perior, qua scilicet palato adnectitur, tenuior
 extiterit, caput veto quo linguā spectat vuę
 instar, rotundum atq; orbiculare increuerit,
 radicitus eam (candenti ferro ad id parato,
 ac per canalem aliquem ori immisso) præscin-
 dito. Caueto tamen ne priusquam ad eam fi-
 guram perueniat, eam amputes, siquidem ta-
 lis sectio interdum tantū concitat sanguinis
 profluxum, vt nullis præsidijs fisti queat.

De hi:

¶ De hirudinibus gutturi incidentibus, aut alijs reptilibus fortuito irreptantibus.

Caput. xlviii.

DVm quis in guttore pruritum titilla-
tionemq; experitur, & sanguis tenuis
modice inde refudat, suspicio est, hîrudinem
deuoratam esse, præcipue si aquam cui hiru-
dines innatant, hauserit. Aegro itaque ore
magnum hiare, & linguam exerere præci-
pito, & linguæ basi pressa, fauces ad solem
inspicio. Iam si sanguisugam prope adhæ-
rescere conspexeris, vulcella, quibus tela ex-
trahi solent, capite eius compresso, sangui-
sugam euellito, talique industria ægrum ab
ea liberato. Verum si conspectum hîrudo
fugiat, æger subinde sinapi cum aceto gar-
garizet, siquidem acris incitata, a loco
cui inhiaret, dimouebitur. Vel ex aceto &
succo Cyrenaitico, aut sale, gargarizationes
ad eandem utilitatem, ægrotanti porriges.
Præterea nigellâ & sinapi trita, gutturi utili-
ter inspirabis. Itē ex cepe succo gargarizatio-
nes præbebis. Ceterū si post euellâ hîrudinē,
sanguis fluere perseverat, ex iure cui mali
puni

P A R A. I N N O N N V M

punici cortices , balauftia & rhus corfarium
 incocta sunt, gargarizationes parato . Gut-
 turi quoq; balauftiorum puluerem, thus, cin-
 nabarim & amyli infufflato. At fi ftomacho
 hirudo adheferit , medicamina quibus uer-
 mes propelluntur, propinato. Ex horū quo-
 q; genere, quæ hirudines diuertunt , prima
 balnei domus cenfetur , fi illi æger tantifq;
 dum multa fitis ipfum vrgeat , immoretur,
 ac deinde aquam frigidiffimam, niue fcilicet
 infrigeratam, ore contineat , & quum aqua
 tepuerit, eam reñciat, aliamq; recipiat . Hi-
 rudo fi quidem aliquoties frigoris cupida ,
 ad os prorepit.

¶ De his quæ in os, feu oefophagum
 prolabuntur. Cap. xlix.

SI quando quod in guttur deuoluitur, oefo-
 phago, aut eius parti tanquam infarci-
 tum inhæreat, fitq; id, aut bolus aliquis grā-
 dior, aut quippiam illi nō abfimile , nimirū
 quod nec asperū, nec angulosum fit, aut para-
 tibus inter fe diuifis conflet, iuuat identidē
 ægri ceruicem concutere , ac liberaliter a-
 quam transfglutire, ea namq; ratiōe forfitan
 ad

RHAZAE DE MOR. CVR. 147.

ad inferiora propelletur. Aeger præterea bal-
neum potabilis aquæ ingressus, oleum, aut a-
lia emollientia ac humectantia bibat, ac de-
inceps magnos bolos diglutiat. Si vero ne-
tum quidem in vëtriculum procidit, instru-
mentum corporibus ex œsophago propellē-
dis adaptatum, ori immittitur. Est autē hoc
instrumenti genus ex plumbo factū, quodq;
cum longum sit, retisq; instar confabrica-
tū in omnem gibbositatem facile effingitur,
ac ea industria œsophago inuolutum corp⁹,
in ventriculum protruditur.

Mulci obi-
lōga cerea
cādela ole-
o tepēti in-
tincta ut-
untur.

¶ Ad oblaesum linguæ sensum, ac deficientem
motum. Caput. I.

Q Vando lingua cæteris mēbris illę
sis, torpida redditur, nulla tamē fe-
bris, aut alius acutus & ardens morbus, æ-
grum infestat, sumito salem ammoniacum,
piper, zingiber, sinapi album, pyrethrum, her-
bę pediculariæ semen, nitrum, origanum, sac-
charum, nigellam, sampsuchum aridū, ac ex
his simul in aqua decoctis, gargatizationes
parato, interim tamen prospiciat sibi æger,
ne portionem aliquam huius liquoris deglu-
tiat.

Ex pituita
et affluxu

PARA. IN NONVM.

tiat. Profunt quoque pluribus diebus ieiuno ægro, gargarizationes ex muria Nabathææ, aut aceto & pyrethro, præparatæ. Vbi vero æger os colluere his cessauerit, accipito salis ammoniaci, pyrethri, piperis, sinapis singulorum æqualia pondera, & his in tenuissimum pollinem subactis, linguam diu huiuscemodi puluere infricato.

A nimia
siccitate.

Quod si linguae stupiditatem, auditus, reliquorumque sensuum torpor concomitatur, laboranti præsidij partium resolutioni dicatis, subuenies. Porro si in acutis febribus sermo difficilis fuerit, viderisque cum sermonis difficultate, extenuatam & breuiorem conuulsamque esse linguam, aqua calida in qua herbæ emollientes humectantesque ebullierint, super colli vertebrae, & aurium principia, vbi scilicet mandibularum articulatio est, opportune superfundetur.

Præterea partes illæ humectante oleo, infricandæ sunt, & ægrotanti oleum modice inferuefactum, ore retinendum. Et si multum temporis lapsum fuerit, ex quo sermo aboleri visus fuerit, aut si a primo ortu primaue

RHAZAE DE MOR. CVR. 148.

maue conformatione id euenerit, ope rapre
cium est indagare, an ligula faucibus lin
guam colligans, præter naturam excreue
rit. Quod si inueneris, parum eam præscin
dito, ac vulnere chalcithidis puluerē ad cru
stam inducendam, inspargito.

¶ Ad linguam in nimiam molem intumesceniam. Caput. li.

CVm lingua in tantam molem incre
uerit, vt ore retineri nequeat, fricanda
est cepis, aut citricum acido succo, aut \div ri. ¶ Veteris
b² icogni
tū, Manar
duseius lo
corumicis
succo vti
tur.
bes, aut malo punico acido, donec multa sa
liua defluerit. Ea namque ratione decre
scet, pristinaeque formæ restituetur. Si ve
ro id tamen non suffecerit, aceto & sale di
ligenter linguam infricato, & si hoc quoq;
inualidum extiterit, primum sanguinē ex
duabus humeralibus, deinde ex venis sub
lingua latitantibus, detrahitō.

¶ De tumore sub lingua enato, qui ranula
dicitur. Caput. lii.

Tumore huiuscemōi maligno sub lingua Græce β²
τ²α²χο².
accidēte, iter iniitia lingua sale ammi
aco, et gallis cōfricāda ē. Vbi eo tumore i ve
rusta

P A R A. I N N O N V M.

tustatem protrahito, medicamine cruētis gingiuis dicato, lingua infricabitur, & ægrotus deinde ore acetum cum sale contemperatum retinebit.

¶ Ad pustulas ac tumores lingue.
Caput. liii.

H Is eisdem remedijs quibus aphthis supra cōprehensis, & auging medemur succurritur.

¶ De angina. Caput. liiii.

Ex sanguinis copia.

Affectum Latinis anginam, Græcis σινάγχη, appellatum, testatur inter deglutiendum ac respirandum, percepta difficultas molestiaque. Qui morbus modo grauior, modo leuior, pro transglutiendi respirandique difficultatis magnitudine pronunciat. Quocirca quando transglutiendi noxæ adsunt faciei & oculorum rubor, corporisq; repletio, in ipsius curationis initio humeralis incidenda est, & gargarizatio ex malo punico acido cum sua carne, preparanda. Vel gargarizationem ex succo malorum syluestriū igne incrassato, aut rubi fructus succo, similiter parato. Et deinde ex rosacea aqua,
cui

RHAZAE DE MOR.CVR. .49.

cui rhois decoctū adiectū sit, collutionē porrigito. Postq̃ hac triduo diligenter sint facta, & alius succo fructuū veluti prunorū, tamarindorum, cassia fistula, manna, quam veteres mel aeriū appellarūt, fuerit soluta, gargarizationes ex decocto ficuū caicarū, & vuarū passarū, vel e medulla cassiē fistulę cū hydromelite porrigito. Si aut̃ malū lōgī⁹ prorogāt, gargarizationibus & īspiratio-
ne acriū medicaminū, quę subiiciā, vtemur.

At si nullo in facie rubore æger suffusus fuerit, & copiosa pituita ab ore profluxerit, ad hæc si egrotans frigida temperiē sit, statim inter initia aluū catapotijs coccijs deijcto, & acriorem clysterē capite de apoplexia descriptum, infundito. Sed si malū incoeperit, gargarizationes propinato ex syrupo acido, qui aceto saccharo & aqua potabili, preparat, vel ex hydromelite & pipere, & oxy-
melite. Temporis vero successu ex muria Nabathę, hydromelite & sinapi, collutiōes administrato. Ex eorum genere, quę ma-
lignis anginis, post aliorū & retrahentium & euacuantium vsum, auxilium præstant,

G. sunt,

A pituita
se succo.

Sūme pe-
riculosa
āginę cu-
ratio.

PARA IN NONVM

† Alibi
cum

Hæc om
nia inter
initia, vi
tare oportet.

sunt & sanguinis ex venis sub lingua latissimis immixtio, & cucurbitulæ, † sine cutis incisione, collo affixæ. Sunt præterea collo applicanda fomenta humida, ex melle quod anacardinum supra appellauimus, idq; tantisper, dum vesiculæ excitentur. Sic quoque ad eundem usum, ex sinapi gargarizatio, vtiliter exhibetur. Faucibus autem subsequenter puluerem inspirato. Qui accipit, salis ammoniaci, pyrethri, nitri, succi Cyrenæici, mentastri, partes aliquot, & hæc in puluerem detrita, faucibus insusflato, aut cum hydromelite gargarizationis loco porrigito.

¶ De tussi. Caput. lv.

A calid.
& sic.

CVM tussis aspera & arida cum rubere cæstusq; molesta est, laboranti aqua cui violæ immaceratae sunt, cuiq; saccharum in condimentum adiectum sit, & pūsana propina buntur, fabas quoq; excorticatas & spinachiam vocatam herbam, cum oleo amygdalarum dulcium, inter cibos assumet. Aquæ autem, quæ potui porrigetur, violaceus syrupus conmiscendus est. In ore vero sub lingua æger retinebit globulos, qui quum ad pellendam tussim

RHAAZAE DE MOR.CVR. .90.

sim faciunt, a Græcis ΒΗΧΙΚΑΙ appellantur. Quorum compositio hæc est. Succī dulcis radicis, sacchari albi vtriusq; drachmę decem; amyli, tragacanthæ, amygdalarum dulcium cortice liberatarū singulorum drachmę quęque, hæc nucleorum cotoneorum cremore excepta, in globulos redigito. At industriū esse oportet eum, qui medicamentum linguę subijcit, vt paulatim eo liquecente, larynx id quod in eam defluit excipiat, quod tussī resistens optime curabit. Porro si tussī præsens glutinosi sputi copia expuitioni contumax, noxam inferat, quæ tamen febri & vehementi alui solutione vacat, subsequentes pastilli infirmo propinandi erunt. Qui constat, seminis fœniculi, seminis apij, succi dulcis radicis, adiantī, amygdalarum amararū, singulorum æquis portionibus, hæc simul lini seminis succo excepta, in pastillos digeruntur, quorum denarij tres offeruntur. De coctum vero, quo in proposito affectu utimur, quoq; iā cōprehensos pastillos læuigam⁹, capite q̄ distillationis subsidia scribuntur, præceptum est, illi tamē drachmę quęq;

Apituit
copiz.

PARA. IN NONVM

adīanti, et hyssopi momentū opportune adij-
 citur. Si vero eo vetustatis, & malicieī tussis
 deuenerit, vt laborantem vigilijs excru-
 ciet, globuli ex styrace illi porrigendi sunt.
 Qui recipiunt myrrhæ, styracis, opij, singu-
 lorum pares portiones, singuntur ex his glo-
 buli lupinorum instar, & horum vnus, aut
 alter ore sub lingua retinendus, (vt eliques-
 scēs deuorari queat) offertur. Aut quum ab
 huiuscemodi globulis abstinetur, dormitu-
 ro ægro syrupi papaueris vncia, vel albi pa-
 paueris semen cum saccharo, ad manducan-
 dum, præbetur. Is autem qui hoc malo corri-
 pitur, ab omni acidorum, salforum, austerorū
 acriumq; esu, coarcendus est. Suffumigatio
 ad veterem tussim foetidaq; sputa efficax. Su-
 mito aristolochiæ, myrrhæ, styracis, galbani
 singulorum pares modos, auripigmenti ru-
 bri quantum omnia pendent, hæc in pulue-
 rem subacta, butyro vaccino subigito, ac ex
 eis probe mazas pilæ instar, confingito, &
 quum vsus exigerit, ieiuno ægro harum v-
 nam carbonibus superpositam, per infumi-
 bulum suffito.

7. secūdū
 locos ha-
 bes gene-
 rosū dia-
 codyon.

Mirifice
 exiccat.

De diffi-

RHAEDEMORCVR. 51.

¶ De difficultate spirandi, quā Græci & Ægypti
appellant. Caput. lvi.

DVm quis crebra tussi correptus, fræ-
quenter respirat, quemadmodum so-
lent citatiore cursu, aut vehementi exercitio
fatigati, & quando supinus decumbit gra-
ui⁹, dū vero recta ceruice sedet, min⁹ affici-
tur, subscriptum decoctum illi propinandū
est. Accipit autem ficuum caricarum drach-
mas decem, palmularum pinguium ac recē-
tium, seminis apij, seminis fœniculi, adian-
ti, dulcīs radicis, hyssopi, marubij singulo-
rum drachmas quinque, incoquantur simul
tribus libris aquæ dulcis ad duarum libra-
rum euaporationem, & deinde percolantur.
Huius decocti iuris suspensiosus triduo vn-
cias quinque bibet, adiectis interim subscri-
ptæ confectionis drachmis tribus, quæ ad
hunc modum se habet. Dulcīs radicis suc-
ci, hyssopi, adianti, singulorum drachmæ
decem, cardamomi, piperis, amygdalarum
amararum, aristolochiæ rotundæ, seminis
urticæ singulorum drachmæ quinque, mel-
lis despumati quod satis est. Confectio

A glutinosa pitu-
ita pul-
mōis me-
atibus im-
pacta.

hec

P A R A . I N N O N V M

hec efficiendis e thorace recremētis, ꝓaptis-
sima est, quocirca septimana vna continuo v-
tiliter æger ea vretur . Deinde post sinapis
& mellis esum, vomitus irritandus est, aluius
que catapotij his ducenda . Accipiunt au-
tem , agarici quantum pendent hordei gra-
na octodecim , cucurbitæ syluestris carnis
grana sex , succi cucumeris asinini quan-
tū pendent hordei grana quatuor, dulcis ra-
dicis succi sesquidrachmam, singuntur ex his
catapotia , quæ vni propinationi sufficiunt.
Post hæc decoctum vnā cum confectiōis vsu
repetendum est . Postremo vomitum quoq;
& ventris deiectionem reiterare conuenit.
Et hæc vniuersa quoad sanitati eger restitua-
tur, sunt tentanda, interim vero, a crassorum
& acidorum & austerorum esu, ægrotus di-
ligenter arcendus est.

¶ De laterali dolore, qui πλευρίτις Græcis
dicitur . Caput. lviij.

Cum quis in membrana costas succin-
gente, dolore punctili laborat, præci-
pue si tussis sicca & febris illum concomite-
tur, competit, si dolor qui a summa humero-
rum compage ad extremas earum costa-

RHAEZAE DE MOR. GVR. .92.

rum cartilaginea est, usque ad clauicula. Hip. & Gal. ac alij Graeci uicula peruenit, sanguinem ex axilla fere omnes, affluente fluxu lateris partis, quam dolor inferumque sanguinem in co- stat, minuere, nisi forte vniuersum trarium reuellentes, atque iam corpus sanguine plenum plethorici in partem affluxum a loco cum fuerit. Tunc enim ex latere op- quae maxime vicina una dirigitur posito sanguinis detractio, non mi- tes, edirecto lateris affectu nori comodo celebrabit. Porro uenam etiam corpore plethorici si morbus ad dies aliquot agrum ad- rico, ac inter initia, oppor- fluxerit, fluxusque constituerit, sanguis tunc secatur, aliter quam Ara- missus ex cubito affectu lateris, et eorum sequaces, quos cer- remedio est. Si autem ad inferiora co- mos oisus merito quis ap- starum interualla circa hypochondria dolor descende- (pellauerit. derit, alius decoctio, cap. de distillatione compre- hēso, ducenda erit. Ceterum verum turbationem, quam purgatio accersere solet, praestabit uenam incidere, deinde hordei decoctum cui saccharum ad- mixtum sit, potum pinare. Quod si tussis admo- dum arida sit, mane singulis diebus iuleb violatū (Graecis iozulapon appellatum) porriges. Eius autem mixtura est huiusmodi. Vio- larum unciae tres, in tribus sextariis aquae per diem macerantur, excolataque aquae, librae tres sacchari adijciuntur. Decem vero hordei de- coctum aegrotanti non inutiliter prebebis.

PARA. IN NONVM

Et si ægri vires deiectę fuerint, pane modice fermentato, ac quam minime salso, frigidaq; abluto, simul cum saccharo eum cibabis. Robustis autem viribus, hordei ius vsq; ad dię quartum sufficiet. Vbi vero iam sputa deſcere egrotans cęperit, decocto ad distillationes curandas a me composito, perpetuo ante hordei decocti potum, donec restituatur eger vteris. Porro si febris, vehemētiaq; morbi p̄seuerauerint, atq; ægre sputa educere egrot⁹ valuerit, decoctū capite de respirandi difficultate descriptum, præbebis. Quod etiam dū eger sansem expuet, vtiliter administra bis. Ceterum si inter morbi initia sputa valde nigra flauaue apparuerint, & ita continuata fuerint, et neq; febris, neq; calor ante septimū diem se remiserint, haudquaquā affectus timore vacat. Præterea si præter hæc, eadem spirandi difficultas permaneat, & simul audiatur in thoracis cauitate murmur aliquot, similiter si genę ac oculi multo rubore suffunduntur ac dolent, affectus in maturam mortem præcipitat. Quod si lateris parte exteriori, rubor aliquis suffusus, tu-

Nothæ
pleuriti-
dis cura
flo.

mox

morue conspiciatur, & locus affectus tactu indoleſcat, ad cucurbitularū vſum (ante ſumma cute leniter incifa) properādum eſt. Aut emplaſtrum ex ſinapi & ficubus recte, donec modice locum exulceret, imponetur. Prius tamē opportuna venæ ſectiōe, aut purgatione, quæ huic malo idonea eſſe poſſet, & humoris affluxi leni reſolutione, tentariſ. Sane ex imperitorū Medicorum hallucinatione, multa huic malo accidunt augmenta, veluti quum in mēbrana coſtas ambiēte, craſſos flatus infarctos conieſcunt, conieſtionem diamoſchum appellatam, aut huic in diſcutiendo & incidendo viribus parem, porrigunt, qua ratione medicandi, ægrum plane iugulant. Affectus porro, qui in ſpurias coſtas integente membrana, ex inflammatione oboritur, Arabibus Perſica dictione birſen (quaſi thoracis noxa) dictus eſt.

¶ De pulmonum inflammatione, quæ πνευμονία Græcis dicitur. Ca. lviij.

Q Vando hominem febris ardens corripit, tantaq; inter ſpirandum difficultas oboritur, ut ſe ſtrangulari exiſtimet, &

P A R A. I N N O N V M

& quum tanto rubore malæ suffusæ sunt, ut tinctæ videri possint, ac dum thoracis parte anteriori grauitas, & tussis, et pectoris distictio (tamen absque dolore punctili) premunt, quodq; per sputa deijcitur spumofum ē, is æger, si omnia concomitentur, valentem ac acutam pulmonis inflammationem suffert. Quod si pelliculæ ipsius, quæ cum thorace secundum ipsius longitudinem sunt connexæ, sint inflammatae, etiam dolorem punctilem æger percipit. In curationis itaq; initio e vena axillari — dextra — sanguinis detractio prodest — Nam sola ratione plethoriæ, vena pertusa, in hoc affectu iuuat. Nihil enī a pulmonibus cordisq; dextro ventriculo venæ sectione educi posse, mēbranarū dextri ventriculi cordis, anatomica administratio apparēter demonstrat — Deinde post venæ sectionē reliqua curatio tentanda est, iisdem, quibus pleuritidi medemur.

*Aëtius in
vtrorq; ca
bito per
interval
la secat,*

¶ De cruentis ac purulentis expuitionibus
Caput. lix.

*Ex fauci
bus.*

Sanguis si screatu, aut pauco strepitu, qui absq; tussi est, educitur, nullus erit inde ægro

egro metus, siquidem gargarizationibus ca-
pite ad anginam præceptis, & ratione vi-
ctus tenuiori, sanari poterit. Vomitu Ex vñt
culo,
quoq; si erumpat sanguis, nec inde ingens
egro formido incuti debet. Venæ sectione
namque, & astringentium vsu, quale om-
phacinum est, & rhus obsoniorum, atq; his
persimilibus, persanari hoc vitij genus po-
terit. Sumito itaque lapidis Armenij, gum-
mi Arabici, balaustiorum, cinnabaris, thu-
ris omnium equalia pondera, & horum dra-
chmas tres simplici discocto cydoniorum suc-
co subactas, proponito. A quibusdam ve-
ro sanguis, per circuitus quosdam, expui con-
suevit, vnde non modo nulla noxa illis im-
minet, verum etiam id valetudini multum
prodest. Proinde is minime suppressendus
putatur. Sin autem cum tussi, sanguis Expecta
co.
prorumpat, non immerito formido nos oc-
cupat, nihilominus tamen, egri curationē,
venæ axillaris sectione incipies, partita in-
teri sāguinis missione Deīde subscriptos pa-
stillos potui porriges. Qui cōstāt, thuris, cina-
baris, vtriusq; drachmis tribus et scrupulo vno
&

PARA. IN NONVM

† Carent
nostre of
ficiæ.

succini drachmis quinq; lapidis hematitis,
 ꝑ terræ sigillatæ vtriûsq; drachmis decē, a-
 luminis drachmis duabus cum semisse, ba-
 laustiorum drachmis tribus, opij drachmis
 duabus, rheobarbari Seni tantundem, ex his
 portulacæ succo aspersis, informantur decem
 pastilli, quorum quotidie vnum succo ocimi
 maioris, aut portulacæ leuigatum, propina-
 bis. At si vehementior morbus extiterit, san-
 guinisq; eruptio incrudescit, alterum pastil-
 lum, egro somnum inituro, porriges. Crura
 quoq; circa inguina, & brachia ad scopulas,
 aut potius in tenuioribus partibus (vt pote
 magis nervosis & dolorificis) vinculis in-
 tercipito, ac vna summas extremasq; partes
 ad reuellendum sanguinē, infricato. Pectus
 quoq; præcipue si dolore quopiam iritetur,
 epithematibus ex paulo ante comprehensis
 pastillis, aceto & aqua subactis, præparatis,
 crebro illinendum est. Aegri quidem cibus,
 rhus obsoniorum & omphacinum, eîsq; pſi-
 milia admisceto, & ꝑ terram sigillatam in-
 terpositis interuallis commanducandā pre-
 beto. Inter decubitus autem, supinus, ac p-
 pemo

† nos lapi-
de armez
nio portu-
lacæ suc-
co marce-
rato vte-
mur.

R H A Z AE DE MOR. C V R. .55.

pemodum (absq; dolore tamen) erectus, maxime necessarius, ac perquam utilis est.

¶ De tæbe quæ φθίσις Græcis dicitur. Ca. lx.

Proprie pulmo nū ē exulceratio.

SI quis partium colliquationem a tussi, quæ ex diuturno morbo sit, aut post crebra cruenta sputa, aut multas puris reiectiones patitur, illi lac asininū vtiliter potandū porriges, at si eius facultas non detur, caprinum, cui sacchari momentum commixtū sit, offerro. Quod etiam posteaquam aliquid panis illi adieceris, ægro esui dabis. Quin etiā si huiusmodi generis lacte capis, illud quoq; aque loco, q̄ties sitit, propinabis. Inter dū tñ tenue ac tēperatū vinū potandū exhibebis. Cibū vero ex auis, & hœdorū carnibus administrabis. Aegrotus præterea ieiun⁹ & a cibo, balneo haudquāq; calido, sed tepēte vtatur, solsoq; dulcis aque, diutius sine periculo immorabitur. Et inter cetera, ne alius fluat turbeturue, diligenter præcauere eger debet. Si quidē soluta fuerit, huius pulueris potu cōstringetur. Accipit autē gummi Arabici, lapidis Armeni, seminis myrti singulorum partes æquales, subiguntur oīa

lin.

PARA. IN NONVM

in puluerē, et eius vno die drach. tres cū syrupo albi papaueris, & myrti succo discocto exhibent. Hic puluis ad hūc modū in potu administratus eos qui tussi, & cita aluo laborant, strenue iuuat. Verum huic interdū, vt maiorē astringendū vim obtineat, vtiliter adiunguntur ꝑ xylocaractæ ex Syria, & bdelliū ex Mecha. Porro si e lactis vsu, in febrim æger rapiatur, ptisana pota substracto lacte bene facit. Verū febre conquiescente, ad lactis vsum rursus pperandū. Si aut denuo febris molestauerit, lac fugiendū est, & ptisana quousq; febris abigatur offerenda, qua iterū propulsa, lactis vsus repetitus prodest. Hæc q̄ diu necessitas vrget, quadā vicissitudine sunt faciēda. Interea vero summo studio, ne alu⁹ lubrica fluat, prospiciendum.

¶ De cordis palpitacione. Caput. lxi.

A calida
ocasiōe.

¶ Suble
quētib⁹
capitibus
prostrata

SI febris pulsusq; velox cordis tremorē cōcomitat, egro axillari dextra secta, sanguinē detrahito, & potui pastillos ex cāphora, succo malorū punīcorū acidorū leuigatos præbeto. Hi accipiūt ꝑ spodij, seminis cucumeris citrinati, intybi, lactuæ, portulacę, ro
sa

RHAZAE DE MOR. CVR. .56.

farum, sandali albi omniū æquas portiones,
 & horum singulis drachmis, adijcito cam-
 phorę pondus trium granorum hordei, ac
 his omnibus malorum syluestrium succo de-
 tritis, informato pastillos, & eorum quoti-
 die duabus septimanis continuis, drachmā
 vnam malorum syluestrium succo detritā,
 in potu porrigito. Porro si hæc medicina
 morbo cesserit, lac ex quo butyrum pressum
 est, ne forte continuus pastillorum vsus no-
 ceat, potui præbeto. Alimenta vero erunt,
 pulli ex aceto, & vuae immaturæ succo, aut
 alio quopiam acido condimento elixi. Syru-
 pus quoq; acidus appellatus, qui ex saccha-
 ro apparat⁹ sit, potui vtiliter dat⁹. At si cor-
 dis palpitatio, febrī vacat, ex moscho compo-
 sitos pastillos, in potu offeres. Qui recipi-
 unt mastiches, spicæ, ligni aloës, cinnamo-
 mi, caryophylorū, galliæ moschatę, nucis my-
 risticę ꝓ cubebe, cardamomi maioris & mi-
 noris, corticis citri singulorum sesquidrach-
 mam, moschi obolum, his vino odoro asper-
 sis, informato pastillos, qui syntopi ac cor-
 dis palpitationi strenue auxiliantur.

officinæ
 ebur com-
 bustū ac-
 ciunt.

A frigida

† Nō cō-
 stāt inter
 se Arabes
 nos sub e-
 o nomie
 semina a-
 cria habe-
 mus.

Elect

P A R A. I N N O N V M

Electuarium ex moscho sumptuosum, de-
fectui animi, tristitię, cordis palpitationi &
fastidio utilissimum. Mastiches, cinnamo-
mi, seminis ocimi maioris, seminis ocimi ci-
trinati, seminis melissę, seminis sisymbrię,
seminis sampsuchi, piperis longi singulorū
par pondus, ex his omnibus in pulverem
redactis, drachmę decem sumuntur, marga-
ritarum comminutarum, corallū rubri, cu-
bebe, bombycis crudę hoc est, nondum in
filum contortę intextęq; succini, been albi
& rubri, solū Gręcis *μαλάβατρον* dicti singu-
lorum quoque drachmę decem, moschi Tu-
babetici syncerioris sedrachma, omnia hac
cremore maceratarum myrobalanorum che-
bularum excipito. Hoc sane electuariū ven-
triculi frigiditati, ac cōcoctricis imbecilli-
tati, mirum in modum prodest.

¶ Nostri
rū offici-
narum se-
men pro-
posito
non ē in-
utile.

A biliosi
umoris
opia.

¶ De cholera morbo. Caput. lxii.

Q Vando dolor punctilis atque ero-
dens, tormina, & nausea aliquē in-
uadunt, & si his adsint, aut subsequantur
vomitus, & ventris per inferiora turbatio,
aqua modice inferuesfacta copiosissima cre-
bro

RHAZAE DE MOR. CVR. .57.

bro propinari debet, deinde vomere oportet, digito, aut pinna ori indita. Item alui ductio ne adiuuandus est stomachus. Sin autem vomitus, & alui fluor nō conquieuerint, ad tepente in aquā rursus confugiendū est, bilioso enim humore circūcirca adhærente, vna cū aqua reiecto, stomachus elotus, ac leuior redditus, oblatū sibi cibū retinet. Quocirca vbi morbus remitti cœperit, æger in balneū portabilis aquæ deducatur, cui vnus horæ spatium, aut pro viriū robore, immoretur. Egresso autem balneo, & cibis concoctu facilibus, vt carniū expresso, & vino subastringēte nutritus, ac præcordijs oleo ad id idoneo perunctis, somnū arcescere debet. Et licet immodica ventriculi perturbatio, supra infraq; ac reliqua grauiā symptomata superueniāt, nō ideo animus adijciendus erit, quin potius medicinis subsequētib⁹ malo auxiliū ferendū ē. Initio itaque pastilli ex thure, aqua, aut nitue & malorū punicorū discocto succo læuigati, semel propinandi sunt. Qui si vomitus igruerit, secūdo quoq; porrigēt. At hæc extremas q̄q; brachiorū, & foemorū partes cir-

Relicto morbo, symptomatum curatio,

PARA. IN NONVM.

Pau⁹ hęc
calida sic
in pcepit.

ca inguina, vinciri oportet. Pręterea aquā ni
ue infrigidatā, crurib⁹, & pedibus ab alto
instillare, ac etiā in gelidā aquā descēdere il
licq̃ īmorari, strenue auxiliāt. Vēter porro
epithematis, quę sandalis, rosis, cāphora, gal
lia moschata, simul rosarū aqua aspersis, cō
ficiuntur, irrorandus est. Confert item lin
teum aqua rosarum niue refrigerata īmer
sum, si ventri apponatur, quod vbi tepue
rit, ne cōcalefactum noceat, abijcietur, & al
liud in eius locum superacommodabitur.
Aut cataplasma ex palmulis cum vitis agre
stis floribus & acacia, item hypocistidis &
mali punici succo, est inducēdū. Porro pau
latim vinum verue decoctio malorum puni
corum succo contemperatum, propinabi
tur. Et quotiescumque eger euomuerit, toti
es aliud, post modicum intervallum, effere
mus. Cibus autem panis malorum punico
rum succo maceratus, vna cū vino subastrin
gente erit, quem si vomitu eructet, rursus
quousque vomitus sedetur, panem porrige
mus. Si vero animi deliquio eb ingenteme
uacuationem, eger corripiatur, moschū hor
del

RHAZAE DE MOR. CVR. .58.

dei grani instar, vino leuigatū dare prodest.
Proinde si os clausum teneat, vi apertū est,
& vinū infundēdum. Sic quoq; hœdorū &
pullorū carniū expressum, & mali cydonij
succus, vino cōmixta, vtiliter porriguntur.

Præter hæc, ante egri nares alios pullos dis-
cerpere iuuat, si modo carniū vaporem non
abhorreat. Thus quoq; ad ventriculī reten-
tricem facultatē corroborandā, ore cōmandu-
candū, vt paulatim eger id trāsglutiat, dādū
ē. Postremo; bol⁹ Coracesi⁹ cāphora cōdit⁹,
et in puluerē adamussim trit⁹, atq; cū astrin-
gēte vino porrect⁹ iuuat. At oibus, quę huic
malo cōmoda p̄cepimus p̄sidijs, donec vo-
mit⁹ cesset, vētriculusq; alimētū sentiat, erit
insistendū. Postq̄ vero vētricul⁹ cibū ample-
cti cœpit, cibādus eger ē, et modicū vini vē-
teris, ac odorī potui porrigendū, sōnusq; ad
restituēdas vires, cōciliād⁹. Pastilli ex thure,
vomituī sacri. Boli & Coracesij, thuris āborū
drach. x. & cubebe, cardamomi vtriūsq; drac.
duę cū semisse, cāphorę, gallię moschatę, cary-
ophylorū singulorū obol⁹ informato pastillos
pōdere sēsquadrachmæ ad vomitum efficaces.

Plini. vñ
opinor.
Tauri lvg
dinū lap
dē vocat.

Nos na-
stro arme-
rio. et as-
cri semie
vtamur.

H II Deco

P A R A. I N N O N V M.

Decoctione quidem mali punici succum
 incrassatū, ad hunc modū apparabis. Sumito
 malorū punicorū acidorū succum, ac per no-
 ctē, paulatim amplius, quod crassum est, in sū-
 dum residere sinito, deinde tantisper dū mul-
 ti spissitudinem accipiat, decoquito, & dili-
 genter spumam detrahitō, ac dein ab igni re-
 moto (tamen adhuc calenti) menthæ viridis
 coliculos injicito eosq; cum succus iā refrige-
 ratus est, extrahito. Ad huius formā cydoni-
 erum malorum, & malorū sylvestriū acido-
 rum syrupos fieri decet. Si autē vomitus
 aliquoties inualuerit, proruperitq; cucurbi-
 ta magna cū multa flāmā, orī ventriculi affi-
 xa, ac vi abstracta, eaq; secundo ac tertio ag-
 glutinata, plurimum egro auxiliatur.

¶ De ventriculi imbecillitate. Cap. lxiii.

Ventriculi imbecillitas si cum modica
 siti, & longa cibi in ventriculo mora,
 ructibusq; acidis, agrū affligit, & sympto-
 mata hæc pauca, neq; admodū vetera sint, ve-
 triculus pastillis ex rosīs confectis, sanitati
 restituetur. Quorum æger singulis diebus
 mane denarios duos, & totidem obolos, cū

Ob frig.
 di distē,
 periem.

vncia

RHAZAEDE MOR.CVR. 39.

uncia seminū incidentiū decocto dissolutes,
 deuorabit. Seminū aut decoctum in hūc mo-
 dum p̄paratur. Cumini Nabathę & am-
 meos vtriūsq; drachmæ duæ, in mina aquæ
 tantisper dum ea rubescit incoquantur, de
 quā deinde cum pastillis ex rosīs ægro mē-
 sura supra comprehensa propinatur. Pastilli
 vero ex rosīs accipiunt, pulueris rosarum ru-
 brarum drachmas tres, ligni aloës, spicę ma-
 stiches, casiaę ligneaę, iunci odorati, cinnamo-
 mi, absinthij singulorum drachmam vnā,
 hæc vino veteri conspersa, in pastillos redi-
 guntur. Verum interim ager alendus est, ci-
 bis q̄ minimum humectantibus, & concoctis
 facilibus, parumq; excrementitjs, ex quorū
 genere pulmenta aromatibus & odoratis
 incidentibusq; seminibus p̄parata, & aliq̄
 qui simul & calefaciunt & incidunt cibi,
 sunt. Aegrotanti præterea, ante cibum mul-
 ta exercitatio, minorq; solito aquæ frigidaę
 vsus, & postq; cibis in ventriculi fundū de-
 scenderit, profundus somnus, illito prius vē-
 tre oleo nardino, magis iuuat. Vino aut
 veteri & mero parce, ne cibus in ventriculo
 fluctet.

PARA. IN NONVM

fluctuet, vteſ, atq; omnino vict⁹ rationne ex
 tenuabit. Qd si hæc symptomata iueteraue
 rit incrudueritq; electuarij ex cumino & ele
 ctuarij ex thure vtriusq; ſeſgdrachma, cū vn
 cia vini veteris ac meri diluta, recte exhibe
 bit, & victus ratio eadē cū paulo ante præ
 scripta iſtituetur. Electuarium ex cumino,
 Cumini Carmaniani drachmæ cētū, zingi
 beris drachmæ viginti ꝑ piperis drachmæ de
 cem, ſoliorū rutæ, nitri naturalis & integro
 ris vtriusq; drachmæ decē, omnia deſpuma
 to melle excipito, & huius antidoti, ſi aliud
 non reſpōdeat, portionē aliquam porrigito.
 Sin autem cira ſit, electuarium ex thure præ
 beto, cuius compositio infra capite de vētris
 profluuiō deſcribitur. Porro ſi hæc ineffica
 cia fuerint, ferri recrementū vino leuigatum,
 aut potius quæ ex eo eſt, compositiōem da
 to. Præparabis quidem ſtercoris ferri cōpo
 ſitionem, ad hunc modum. Seminis apñ, ſea
 rainis ſœniculi, aniſi, cumini, ammeos, ꝑ a
 niuden, origani, liguſtici, cari, ſemnis coriā
 dri, piperis nigri, piperis longi, cinnamomi,
 thuris, ſpice, caryophylorum, nucis myrſti

A maio
 ri causa.

† alibi al
 bi additur

† Arbor
 apud A
 iii. ſub no
 17. 18.

RHAZAEDE MORCVR. .60.

ex cyperi, zingiberis singulorū ſesquidrachma, ſtercoris ferri drach. quīdecim, omnibus vini centuplum addito, & ad dimidiās decoquito percolatoq;. Eius percolati medicamenti ægrotanti drachmas triginta ex vino adminiſtrato, ac vna victus rationem tenuiorem inſtituito. Hæc tribus ſeptimanis commodè repetuntur, & recte ab acidiſ & recentioribus fructibus, & frigida aquæ potu, abſtinetur, vinumque moderate vtiliter propinatur. Cataplaſma ad ventriculū calefaciendum corroborandum que multum efficax. Sumito ſtyracem, ſpicam, iuncum rotundum, abſinthium, calamum aromaticum, maſtichen, & ea vino veteri & cydoniorū ſucco aſperſa, in cataplaſma ventriculo ſuperinducendum, dirigito. Ad hæc optime facit ventriculo ex oleo nardino & cyprino friſtio illinitioq;. Quinetiam & lana ſuccida prædicto oleo repente imbuta, linteoque ventriculo ſuperligata multum iuuat. Potui autem ægrotanti vinum vetus calidumq;, aut hydromel propinabitur. leiuno vero ægro, aut ſaltem tribus
horis

P A R A. I N N O N V M

horis ante cibū, diacydoniū (Arabibus miua
 appellatū) mediocris mystri modo dādū est.
 Apparatur aut ex malis cotoneis pharmacū
 hoc modo. Ex malis cotoneis maiora iucun-
 dioraq; & minus acerba, quæ videlicet stru-
 thia appellantur, eligito, expressumq; eorū
 succū, diē & noctē totā, quo resideat relinque,
 deinde eo percolato, ex puriore succo partes
 duas sumito, sacchari partē vnā, vini veteris
 vnā, & lente supra prunas, donec mellis spis-
 situdinē recipiant decoquito (hac enim cras-
 situdine stomachica medicamēta præparari
 solent) deinde spumā diligenter auferito. Po-
 stea ad singulas totius libras accipies, zingi-
 beris, spice, cinnamomi, caryophylorum sin-
 gulorum drachmā vnā, mastiches drachmas
 duas, quæ oīa in puluerem tenuissimū detri-
 ta, lineoq; panno illigata, adhuc seruēti de-
 cocto, iniicies, & quum a prunis amotū refri-
 xerit, linteum diligēter expressum eximes,
 ac medicamen ad hunc modum vsui futuro
 recondes. Quod si concoctionis offensæ
 adsint, cibi fastidium & nidorosi oletosique
 ructus, vocatum cotoneorum malorum aci-
 dum

Gale. &
 Alex. pul-
 ueres in-
 iiciūt.

A calida
 intēpe-

RHAZAE DE MOR. CVR. .6r.
 dum syrupū propinabis, quē ad hunc modū
 cōficies. Succī cotoneorū acidorū pars vna,
 sacchari albi totidem, aceti albi ac perlucidī
 quarta pars, oīa simul tantisper dum iustam
 spissitudinem obtineant, decoques. Sane hic
 syrupus ventriculum corroborat, & præter
 q̃ quod eius munia ad actionem excitat, ve
 hementē quoq; eius inflammationē, & estū
 mirifice reprimīt. Aegro autem cibus, qui
 simul & acidus, ac austerus sit, præparabit,
 cuius generis est caro cum immaturarū vua
 rum & malorum sylvestrium acidorū ex
 presso, & ꝑ ribes decocta, & columbæ quo
 q; ventrē mētha infartum habentes, cū mo
 mento salis & omphacino decocta, aliaque
 aciditate & austeritate his correspondētia,
 alimenta sunt. Præterea pulvis hic crebro
 sumendus offertur. Qui accipit, rosarum ru
 brarum drachmas decem, spodij drachmas
 tres, seminis coriandri drachmas quinq;. hu
 ius pulueris drachmę duę succo malorū pu
 nicorum acidorum, & syrupo acido cydoni
 orum insparsa porrigunt. Ceterū si pau
 lo ante dictis symptomatibus corporis ma
 cies

¶ Nos a
 cerosa uo
 cata here
 ba vte
 mur.

A sicca
 & calida
 itēperie.

P A R A . I N N O N N V M

cies inflammatioq; adsint, laboranti lac & hordei decoctū ppinet, ac herbis humectati-
b^o refrigerantibusq; ex q̄rū gñe lactuce, mal-
uē, cucurbitę & citrinati cucumeres sunt, æ-
ger enutriet, nō nimis liberaliter tñ. Iā etiā
hœdorū et lactantiū agnorū carnes, et recen-
tes in petrosis aquis degētes pisces, egro ex
vfu sunt. Ad hęc balneū ieiunus, et a cibo cō-
scendat, eiq; ad tēpus immoret, aut in dulcis
aque tepētis solio indies desideat. Vinū etiā
plucidū & perq̄ dilutū bibat, ac subide geti-
le det, motūq; oēm et exercitiū fugiat. In sū-
ma victus rō, ac reliquū viuendi genus tale
sit, qđ obesitatē pariat. Sed si hūc affectū
inflāmatio, æstusq; vehemētissimus cōcomi-
tetur, vētriculo refrigerantibus inunctioni-
bus, vt oleo quod immaturæ vuæ fuderunt,
& melino, atq; violacei momēto, succurres,
& hordei decoctum potui præbebis, ægrotā-
tiq; eandem medendi rationem cum hecti-
ca febrī correptis, institues.

Ab itēfio
re intēpe-
rie,

¶ De oris vētriculi dolore, ac inflāmatiōe. C. lxxiii.

SI oris vētriculi dolorem, eiusdem sub-
uersio, & erosio nausęq; subsequantur
ægro,

RHAAE DE MOR. CVR. .62.

agro liberaliori aqua modice inferuefacta Absq; in
 porrecta, vt vomat (digito, aut pinna oleo ma flā. a calio
 dente, in fauces inserta) precipiemus. Cete do humo
 rū si hoc inualidū fuerit, alius hiera picra, vt re.
 in ventriculi tunicis impactū succū expur-
 gemus, ducenda est. Accipit aut amarū hoc
 medicamē, pulueris rosarū rubrarū, spice, ma Differt a
 stiches, ligni balsami, fructus balsami, cinna Gal. 7. me
 momi, cassiæ lignæ, asari singulorū drach. thodi.
 quinq; aloës rufi coloris iocinorisq; modo
 cōcreti duplū oīm, quod diligenter detritū,
 alijs simplicibus medicaminibus læuiga-
 tis, & incerniculo ex tenuissimis setis, aut
 serico constructo, cribratis, commiscetur,
 atque rursus omnia simul cum aloë con-
 teruntur. Huius autem quantitas, ab au-
 reis duobus ad denarios duos vsque, offert.
 Laboratī quoq; quotidie panē vīno austero,
 & mali punici succo supra descripto, cotone
 orūq; acidorū syrupo, maceratū, prebeto. Si Ob frigi
 aut dolori acidorum & flatuosorū ructuū co dū succū
 pia ventriculique distentio, ac singultus af. & flatus.
 fuerint, exhibeto electuarium diacymi-
 num, & diacalamenthēs, & alia consimilia,
 quibus

P A R A. I N N O N N V M

quibus discutiendi vis adest, quæ capite de
 intestini laxioris vitij præsidij persequar.
 Cibi autem ægri erunt pulmenta aromati-
 bus & calefacientibus seminibus appa-
 rata. Potui quidem paxillulum vini veteris et
 meri propinabitur. Exercitia quoque & me-
 dicamentosarum aquarum balnea non mediocri-
 ter iuvant. Quinetiam ventriculum penicil-
 lo nardino oleo, aut quopiam alio calefacien-
 te, & subastringente, imbuto, fouere condu-
 cit. Porro si oris ventriculi dolorem, febris
 una cum manifestæ inflammationis indicijs,
 et estu, qui tactu de iudicari possit, subsequantur,
 mox inter curationis initia, axillari dex-
 tra secula, sanguinem detrahito, & dolenti loco san-
 dala, rosas & camphorâ, simul rosarum a-
 qua, & cotoneorum succo læuigata, superac-
 commodato. Aegro vero præter pitisanam nul-
 lum cibum offerre debes, pinde a carni-
 um esu, & compositionibus ex melle confectis in-
 primis arcendus est. At corroborandi gra-
 tia, interdum malorum puniceorum acidorum
 succum, & eum qui ex reliquis fructibus fri-
 gidam & astringentem vim possidentibus,
 decoqui

Cū inflam-
 matione.

RHAZAE DE MOR. CVR. .63.

decoquitur, vtiliter propinabis. Siquidem inflammatio oris ventriculi & iocinoris astringētia desiderant, nam si solo relaxante praesidio curationem tentes, vitæ periculū intuleris. Aestus porro vehementia remissa, cassiam fistulam intybi succo dissolutam, & simul cum eo decoctam, ac diligenter a spuma liberatam, ægro offerre conducit.

Cum vero longius morbus prorogatus fu-
erit, & ardor omnino quieuerit, inflamma-
tio autem in duritiem & scirrhum decide-
rit, emplastrum istud affecto loco superliga-
to. Violarum aridarum drachmæ decem,
rosarum rubrarum drachmæ quinque, spicæ
odoratæ, mastiches vtriusq; drachmæ tres,
cyperi, iunci rotundi, calami aromatici cu-
iusq; drachmæ duæ, farinæ fœnogræci drach.
viginti, florū chamæmeli, seminis althææ,
hordeaceæ farinæ, singulorum drachmæ de-
cem, omnia seminis lini succo aspersa, in em-
plastri formam redigito, ac horis quatuor an-
te ciborum ingestionem, ventriculi regioni
superinducito, ventriculo prius nardino o-
leo fuso. Deinde concocto & e ventriculo
depul

Scirrhi
vêtri. cur-
ratio.

P A R A. I N N O N V M.

Oleū nar-
dinū.

depulso cibo, ventriculi locus, lana nardino oleo immersa, vti iussi irrorandus est. Confectio quidem olei, seu vnguenti nardini simplicis, in hunc modum se habet. Olei glandis vnguentarię, quod proprie balaninum dicitur, libra, spicę semuncia, mastiches, costi, cyperi, iunci rotundi, calami aromatici singulorum drachma vna, vniuersa hæc in pollinem subacta, dictoq; oleo infecta, soli septimana vna, in vase obturato ore, exponuntur, & deinde percolantur. Porro facces sordesque manibus inherentes, cataplasmatibus proposito vitio dicatis, admixtae, plurimum iuuant.

Abcessus
cura.

Ceterum oris ventriculi inflammatione in tantam vetustatem protrahit, vt in abscessum erūpat, pastilli ex spica propinati, optime faciunt. Accipiunt quidem hi, florum iunci rotundi, casia lignę, rheobarbari Seni, calami aromatici, spicę cuiusq; drachmas tres, croci, myrrhę, anisi, costi, piperis singulorum drachmam vnā, bdelli varij drachmas tres, mastiches drachmas duas, ammoniaci drachmam vnā, singuntur ex his pastilli pondere sequi

RHAZAE DE MOR. CVR. 164.

quidenarij, quorum quotidie vnus sapa de-
tritus exhibebitur. Emplastrum ad præ-
dictum affectum valde efficax, quod hac ra- Empla-
strū lau-
datiss. mē
tione præparatur. Bdellij mollis drachmæ
decem, ammoniaci drachmæ quinque, glan-
dis vunguentariæ drachmæ decē, apij semi-
nis tantundem, spicæ, mastiches nigrae vtri-
usque drachmæ quique, ceræ drachmæ tres,
olei nardini drachmæ quindecim, gummi vi-
no subastringente diluitur, & ei omnia cō-
mixta, in emplastrum digeruntur. In vē-
triculi itaque & iocinoris affectibus pro-
fligandis, Medico erudito & natura sagaci,
opus est, vt qui accurate ipsorum dispositio-
nes distinguere, ac curare queat. Nihilomi-
nus quamtumuis succinctus fuerim, capita
& rerum summas, quæ his affectibus præ-
sidio esse possent, hoc nono libro persecutus
sum.

¶ De singulis. Caput. lxxiii.

Quando singultus post crassorum ci-
borum ingestionem, aut vini per-
quam diluti copiosiorē vsū, inuadit, aqua ca-
lida, cui cuminū, mētha, mēthastrū et thuris A flatu, et
crudo suc-
co.
pau-

PARA. IN NONVM.

pauillulū incocti sint, crebro in potu offerē
da ē, & egro, vt sibi somnū cōciliet, precipiē
dū. Vētri quoq; vesicæ, ac sacculi huiuscemo
di decoctis seminibus, & herbis calefacienti
bus discutientibusq; impleti, superligadi sūt.
Quinetiam & eisdē vētricul^o opportune ir
rigabitur. Aeger aut tenuissimo victu, ecq;
incidēte, enutrietur. Cū vero plusculis dieb^o
moderatori cibo ægrotantē alueris, in laco
nicū primam balnei domū subinde ipsum de
duces. Itē insecutis aliquot diebus, illi siccā
tia & flatus discutientia alimēta, præbebis.
e quorū albo sunt, pulmēta aromatibus semi
nibusq; calefacientibus ac incidentibus cōdi
ta, & assi mōtani passeruli, & pauillū vi
ni meraci potui ei tū offerēs, ne forte vini co
pia, cibi fluctuationē in ventriculo creet. At
si hæc non vsq; adeo valida fuerint, pastillos
ex thure porrigo. Quos ad hūc modū confi
cies. Accipe thuris drachmas quinque, inua
le cāpanę drachmas tres, mētastri, foliorū ru
the aridorū vtriusq; drachmas duas, seminis
† sisyambri drachmas tres & semissē, his de
xtris & hyssopi succo subactis, iñormato ex
illis

† talias ne
anē hoc ē
serpilli.

R H A Z AE DE MOR. CVR. .65.

illis pastillos sesquidrachmæ pondere, & eorum vnum in die, cumini decocto læuigatum, propinato. Porro si singultus cum tremore, aut nausea, aut siti, aut oris summa ariditate, post febrim superuenerit, aquam modice feruefactam, nō liberaliter, sed pedestentim, sorbillandam dabis. Et si tali auxilio haud quaquam malum propellitur, aqua cui hordeum incoctum sit, vna cum oleo amygdalarum dulcium porrigenda est. Quæ etiam vertebrae ceruicis & dorsi, humectate oleo tepente perungere, infricareque, non mediocriter conducit. Aegrotanti vero potus, ex herbæ pulicaris seminis, & violarū, & malorum puniceorum dulcium succo, modico saccharo adiecto, parabitur. Preter hæc singultui, qui ex repletione est, ac sternutationi, spiritus compressio, quæ plurimum confert,

Ex illis

De canino appetitu. Cap. lxvi.

SI quis assidua fame crucietur, & tamen cibis assumptus ita grauat, molestusque sit, ut eum mox, aut vomere, aut per inferiora deicere cogatur, oryza illi utiliter edenda porrigit, cui sanies ab agno in fornace asso

Ab acido succo

I ema

PARA. IN NONVM.

emanans, pinguedinis loco cōmixta sit. Ad hæc caudæ, & agnorum pedes, & qui his viscositate & pinguedine respondent cibi, ac commodè offeruntur. Vinum quoq; vetus quodq; impense calefaciat liberaliter (vel nō sitienti ægro) haustum optime facit. Deinde his deuoratis, vt ingesta euomat, ægræ tantipræcipiendum. Ac isto curationis modo, tantisper dum ab omni malo liberetur eger, vt vtatur, consilium est. Sīn vero a cibo

Ab imo:
dica tran
spiratiōe,
aut calido
succo.

nulla molestia afficiatur, neq; per vomitum neq; per aluum illum deiciat, carnes bubulæ & alia concoctū peruicacia edulsa, porrigenda sunt. Quocirca triticum pulvis instar elixum, et oryza cum lacte decocta, accōmodè exhibentur. Potui autem gelida aqua detur. Quinetiam optima ratione, æger in aëre frigidiori ac perspirabili delitescet, & ab omni acidorum & austerorum atq; acriū esu, abstinebit, solisq; dulcibus ac glutinosis enutrietur.

¶ De iocinoris dolore. Caput. lxxvii.

Ex Item
pe. aut hu
more calido

Si decoloratus aliquis, corporis ineptum habitum, ac dolorem dextri lateris sub hy

RHAZAË DE MOR.CVR. .66.

hypochondrijs, ad nothas ac posticas costas,
comites sibi habuerit, & si color, quo suffu-
ditur suppallidus conspicitur, magna quoq;
oris ariditas ingensq; sitis ægrum torquēt,
hordei decocti ius, & herbarum infrigidan-
tium succi, syrupo acido ex albo saccharo de-
cocto diluti, vtiliter porrigentur. Huius au-
tem generis herbarum, sunt intybum, sola-
num, & amplexicaulis. A foris autem, so-
tus, ac asperginēs ex duobus sandalis, rosa-
rum floribus, camphora & momento spicæ
in aqua rosacea simul detritis, præparatos,
ad hunc modum accommodabis. Accipies
lintheum aliquod, & hoc liquore refrigeran-
te & subastringente imbutum, loco laborā-
ti superinduces, et priusquā tepescat, illo a-
moto, aliud in eius locum applicabis, par-
temq; diligenter irrorabis. Potui vero ma-
lorum punicatorū succus, ac similes decoctio-
ne incrassati succi, facultatem refrigerandi
obtinentes, exhibiti prosunt. Quare æger a
vino, & his quæ melle condiuntur, ac ca-
lescentibus incidentibusque cibis, arcēdus
ē. Itē pastilli ex acide sping baccis portecti,

¶ The-
parat. si
necesse

PARA. IN NONVM

non medicæ auxilio sunt. Qui recipiunt, succi baccarum acidæ spinæ drachmas decem, seminis intybi, seminis cucumeris citrinati, seminis portulacæ cuiusq; drachmas tres, rosarum drachmas duas, rheobarbari Seni drachmam vnā, spicæ sedrachmā, redigito hæc in pastillos pondere drachmæ & semissis, atq; eorum vnum syrupo acido saccharo præparato, aut malorum puniceorum succo solutum, propinato. Alium quoque si necessitas virget, succo fructuum, vt prunorum & tamarindorum, ac saccharo albo, dedigito. Porro si viciatus color, iocinoris dolorem subsequens, cū virore albicans mediūq; inter colorem colliquatione laborantium partiū, & colorem tumidarū, extiterit, præterea si ægrotanti aluus laxa fluxerit, et palpebrarum, ac summarū partium tumor, digitorū tactui cedens, ac laxitas affuerint, pastilli ex rheobarbaro Seni, syrupo acido melle composito subacti, porrigendi sunt. Hi constant, mastiches, succi eupatori, succi absinthij, seminis fœniculi, anisi singulorum drachmis duabus, rheobarbari Seni drach

Ab itēp.
aut mate-
ria frigi.

RHAZAE DEMORCVR. .67.

drachmis decem, digeruntur in pastillos pō
dere drachmæ vnus & semissis, atq; eorum
vnus quotidie commemorato syrupo dilut⁹,
propinabitur. Præter hæc, emplastrū ad præ
sentem affectum efficax, ad hūc modum præ
parabis. Accipito spicam, mastichen, cyperū,
iuncum rotūdum, calamum aromaticum, cro
cum & myrrham, deinde myrrham vnā cū
mastiche in vino odorato subigito, ac alijs
his commixtis, finge emplastrum, iocinoriq;
superinducito. Interim vero a cibis crassis,
refrigerantibus, multamq; pituitam gignen
tibus, ægrotantem arceto. At si huiusmodi
inefficacia fuerint, pastillos ex ꝥ cācamo ra
dicum decoctorum iure solutos, exhibebis.
Recipiunt aut pastilli ex cancamo. Cācamī,
rheobarbari Senī vtriusque drachmas tres,
spicę, seminis apīj, ammeos, mastiches, iunci
rotundi, baccarum iuniperi, amygdalarum
amararum, costi amari, rubiæ satīuę, succi eu
patorij, asari, aristolochię rotundę, gentianę
cuiusq; sesquidrachmam, cancamo & eupa
torij succo vino subactis, reliquisq; medica
minibus illis admixtis, formantur pastilli,
pendē-

ꝥ hodiern⁹
frates of
ficine las
cā vocāt⁹

Quidā ad
dunt sabā
nam.

P A R A. I N N O N V M

pendentes singuli drachmam & semmissæ.
 Radicum quidem ius, hac ratione præpa-
 ratur. Corticum radicum apij, seminis fœ-
 niculi, iunci rotundi, ammeos singulorum
 drachmę quinque, rosarum rubrarum drach-
 mæ tres, spicæ odoratæ tantundem, omnia
 in aquæ libra ad tertias bulliuntur, ac ita
 decoctum ius cum commemoratis pastillis
 assumitur. At si inflammatione absces-
 sue iecur conflictetur, eisdem auxilijs, qui-
 bus oris ventriculi inflammationi & absces-
 sui medemur, illi succurrendum est.

¶ De morbo regio, qui & *interpos* dicitur.
 Caput. lxxviii.

A iecino
 scilicet

MOrbo regio si febris affuerit, intybi,
 & solani succi, & hordei decocti ius,
 potui offeruntur, & cucurbitis domesticis,
 atriplice, cucumeribus citrinatis, & alijs
 herbis infrigidandi facultate his paribus, æ-
 ger enutrietur. Iccinori vero emplastrum
 inflammationem arcens, quod duobus san-
 dalis conficitur, illigato, ac aluum pruno-
 rum & tamarindorum succo & saccharo
 densito. Quæ si minus efficacia fuerint,
 pastil

Auer.
 Inter me-
 dicamina
 veteribus
 cognita
 præcipue

RHAZAEDE MORCVR. .6s.

pastillos ex camphora succo puniceorum ma-
lorū acidorum detritos, præbeto. Pastilli de
camphora. Sacchari, spodiij, rosarum rubra-
rum cuiusque drachmæ tres, seminis inty-
bi, seminis cucumeris citrinati, seminis cu-
cubitæ, seminis lactucæ, seminis portula-
cæ, sandali rubri cuiusque drachma vna, sin-
gito ex his pastillos drachmas duas penden-
tes, & horum vnum quotidie cum cam-
phoræ obolo, aut minus pro morbi, ac vi-
rium ratione, propinato. Si æger sangui-
ne plenus, multo tempore venam non se-
cuit, vena axillari dextra pertusa, sanguinē
detrahere expedit. Quod si arquatus est
tra febrim contingat, aluum catapotijs his
(postquam leuiores tentaueris) recte purga-
bis. Aloës drachma vna, scammonij sesqui-
obolus, agastici scrupula duo, succi eupatorii
scrupulum vnum, hæc intybi succo excepta
in catapotia dirigito, & vna dosi exhibeto.
Insuper pastillos ex cancamo, radicū inci-
dentiū decocto subactos, præbeto. Porro si
bilis suffusio in morbo regio oculos dehone-
stare nō cessauerit, æger subinde acetū acer-

A meatu
ū obtura-
tione

& Satisse-
cerit dua-
bus.

rim

P A R A. I N. N O N V M .

rimum olfaciet, & naribus folio infidens idem attrahet, & mirifice iuuabitur, si pressis naribus paulisper id contineat. Oculis quodque ictero cum febris laborantis, aqua rosacea instillanda est.

*Non inu-
ter i eo i-
cidit nia
maceran-
tur.*

Præter ista, arqua-
to implicito, in mali declinatione, tribus
hebdomadibus lactis serum potui porrectū,
non paruum præstat auxilium.

¶ De aqua inter cutem, quæ ὕδρωφ
Græcis dicitur. Caput. lxiix,

ἰσχυρίτης

Cum post iocinoris dolores & febres,
Abdomen intumescere coeperit, ac su-
men (quod spatium inter umbilicum & pe-
stinem est) prominere, & huius regionis cu-
tis extenuari, albescereque visâ fuerit, & quū
concussō abdomine talis auditur sonus, qua-
lem percussī uteri aqua non omnino pleni,
elidere solent, siq; vna cum his vrinæ ruffæ
sint, parua adipiscendæ sanitatis ægro spes
reliqua est, potissimum si is virium robore
destituatur. At cui vires constant & ven-
ter quoq; aridus est, catapotia ex rheobarba-
ro Seni chamæleam in earum mixtura reci-
pientia, porriguntur. Habēt autem huiusce
modi

RAZAE DE MOR. C'VR. .69.

modi catapotia, rheobarbari Seni, succi eupatoriij, seminis intybi cuiusq; drachmas tres, agarici drachmas quinque, chamęleę drachmas decem, singuntur catapotia, quę vt plurimum quantitate drachmarum ꝑ duarum cum semisse, accõmode singulis septimanis exhibetur. Cæterum viribus prostratis, pastillos ex chamęlea præbeto. Qui constant, seminis intybi drachmis decem, chamęleę drachma vna, agarici scrupulis duobus, succi eupatoriij tantundem, rosarum † seminis cum cumeris citrinati vtriusq; drachmis duabus cum semisse, hæc in decem pastillos redigito, ac eorum vnum in die syrupo acido ex saccharo preparato dilutum, offerito. Aluo autem cita profluente, pastillos ex acidę spinę baccis, syrupo acido læuigatos, porrigito. Aegrotantem præterea montanis auiculis assis enutrito, & potui succum cotoneorum cum pari sacchari portione & quarta parte aceti decoctum administrato. Verum si alius plurimum lubrica fuerit, vt symptomati occurras, impermixtum cydoniorum malorum decoctum succum, propinato.

Suffices
rit. 3. x. et 5.

† alias nuc
leorũ ex
doniorũ.

Cete

P A R A . I N N O N N V M

Cæterū si a morbo vrinarū rubor, & gñtus,
 & cutis suppalidī coloris suffusio, absuerit,
 subsequentiā catapotia magno auxilio deglu-
 tiuntur. Constant autem hæc. Chamælex, sa-
 gapeni vtriūsq; sedrachma, sacchari, colum-
 barum ruraliū simi vtriūsq; obolo vno. Lar-
 giter quidē hæc catapotia aquam ducunt, ac
 per inferiora mirifice protrūdunt. Pastilli
 præterea ex cancamo, radicū incidentium e-
 lixarum iure diluti, propinandi sunt. Em-
 plastrum quod aquæ subter cutem speciei
 ἀσκήτης ab vtero sic dictę, strenue auxiliat̃.
 Farinæ hordeaceæ, cyperi, stercoris ouilli ve-
 teris, nītri naturalis, lapidis Armenici cu-
 iusq; æquę portiones, sulphuris viui momen-
 tum, quibus omnibus muria, aut aceto mul-
 so subactis, totī abdomini emplastrū adapta-
 tur, quod insigni vi, in exiccandis humorib⁹
 870 *πρωτῆς* pollet. Cæterum si in palpebris, alijsq; sum-
 88. mis corporis partibus, digitorū tactui ceden-
 tes tumores (*οὐδμήματα* Gręci vocāt) oborian-
 tur, & testes quoq; intumescāt, & facies vna-
 cū totius corporis habitu, laxa spongiarū in-
 star, et albida pītuitosaq; emortui similis ap-
 pareat

RHAZAE DE MOR. CVR. .70.

pareat, hydropis species ἀνάσσει καὶ λευκοφλεγματία appellata, hoēm affligit. Aegro itaq; hac iplicito, pastillos ex cācamo radicū decocto subactos, por rigo. Aliū aut singulis septi manis, catapotijs ex rheobarbaro subducito. Ad hæc, ægrū sabulo arenaq; excalesfacta saburato, ac exercitiū vehemēs, et frequens in sole, & famē sitimq; egrotanti præscribito.

Porro si vēter inflatus, distētusq; fuerit, & ^{τυμπανίτης} cōcussus tympani crepītum ædiderit, aquæ ^{υίτης} sub cutē speciē ^{τυμπανίτην} dictā, adesse certū est. Qua, q iplicitus ē, ab oī olerū vsu, et flatus gignētibus cibis, circūcidendus ē, & ab domē eius indies panico tosto, et momēto salis, ac fursurib⁹, sacculo isutis, fouēdū. Huic præterea cucurbitulæ leues, cū multa flāma crebro toti vētri suffixę, maxie p̄sunt. Quē etiā remedia discutiendis digerēdisq; flatibus inscripta, et ad vrinas efficacia, eligēda sunt, e quorum genere sunt diacymīnum, & ex baccis lauri electuarium, quod capite de ilei morbi curatione, prosequar. Deinde huic quoq; egrotanti, multa exercitia, et fames ingens, strenue auxiliantur.

Sic quo

P A R A. I N N O N V M

Sic quoq; collyria, seu glandes flatulentis spiritibus amouendis dicata, & alia a me capite ad colli intestini vitium remedia describenda, q̃ maxime accommoda cēsentur. Proinde clysteribus ex huiuscemodī glandibus liquore quopiam detritis, vti expediet. Item ventrem etiam aspero linteo tantisper dum rubor excitetur, perfricare, & clysteres ex oleo rutaceo infundere consiliū est.

Ab inflammatione.

¶ De lienis dolore. Caput. lxx.

S Plenis dolorem si æstus, & vrinae ruffe febrisq; subsequantur, infra scriptorum pastillorum portionem egro porriges. Pastilli ex agno casto. Seminis agni casti, fructus tamaricis vtriusq; drachmæ decem, seminis intybi drach. quinq;, seminis portulacæ tantundem, his aceto acri detritis, informato pastillos, & eorum vnum drachmarum trium pondere, aut alias pro morbi magnitudine, syrupo acido ex saccharo preparato, subactū, porrigito. Si vero ægrotantis venæ vniuersi corporis sanguine distentæ turgent, venā axillarem sinistram, aut eam, quæ ab hac ad sinistram manum, inter paruum ac anulare digi-

RHAZAE DE MOR. CVR. .30.

digitos repit, secabis, & sanguinem quantū
pro laborantis corporis habitu satis esse con
ieceris, fluere sines. Lienī quoq; frustum hu
ius generis panni, quem vulgo filtrum vo
cant, aceto imbutum apponatur, & a dulciū
crassorumq; esu æger abstineat. Porro si
absq; ardore quopiam lienis dolor, egrotan
tem torquet, pastilli de capparibus appella
ti, summe auxiliantur. Recipiunt autē, corti
cis radicū capparis, seminis agni casti vtriuf
q; drachmas decem, scolopendrii drachmas
septem, aristolochiæ tenuis, foliorum rutæ,
seminis nasturtii, acori, nigellæ singulorum
drachmas tres, ammoniaci drachmas tres,
ammoniacum aceto diluīt, & ceteris omni
bus eo aspersis, finguntur pastilli drachma
rum duarum pondere, quorum vnus syru
po acido melle cōposito, et radicū iure ma
ceratus, potui datur. Porro si intensus tu
midusq; splen fuerit, & cum premitur rugi
tus aliquis sub tangentis manu auditur, iā
comprehensos pastillos, radicū decocto di
lutos, præbeto. Potui autem vinum vetus, ac
meraculū porrigito, et quoad fieri potest, fri
gidæ

A fri. hum
more,

Ex flatu

PARA. IN. NONVM.

gide vsum subducito. Emplastrum ad
enis flatus, eiusdemq; simę partis duricię,
optime faciens. Foliorum rutę drachmę de-
cem, nıtri, mentastri aridi vtriusq; drachmę
tres, ammoniaci drachmę septem. ammoni-
acum vino veteri subigito, & eo cętera per-
fusa, in emplastrum digerito, lienisq; regiõni
fascia, aut insıtita illigato.

¶ De morbis intestini plenioris & tētibris
hic ἰλεος, ille κώλικος Gręcis dicitur.

Caput. lxxi.

Heus a fri-
gi. humo-
re

SI ventris dolor, vna cū eiusdem attrictio
ne, & ciborum fastidio offendit, absq; ri-
men omni ardore, & febris, ea quę alium ci-
tra vomitus irritationem ducunt, porrigen-
da sunt, cuius notę electuariū ex gallia mo-
schata est. Quod accipit, mastiches, caryophy-
lorum, zingiberis, piperis nigri, pıperis lon-
gi, cinnamomi, nucis myristicę, & gallię mo-
schatę singulorum drachmas decem, scāmō-
nıj drachmas decem, deinde exprimitur co-
ctoneorum acidorum & recentıū succus, quı
aqua mellis portione, donec medicinarum
ponderi ambo respondent, commiscetur, &
dei

¶ Pastilli
sūt, & ad
feruntur
ex orięte
nō bñ pa-
rati, Ma-
nar.

RHAZAE DE MOR. CVR. 72.

deinceps simul omnia, pedetentim supra prunas, ad debitam crassitudinem decoquantur. Quantitas autem presentis antidoti una vice exhibenda est, inter drachmas duas, & duas cum semisse. Quod si dolor vehementi ciborum nausea vacet, & aeger deuorata medicamina vomitu haudquaquam diuertit, catapotia ileo morbo sacra exhibentur. Quae consistant, cucurbitae syluestris, sagapeni, vtriusque drachmis decem, scammonij drachmis tribus & scrupulo, singulis catapotia, ex quibus oboli quinque administrantur, haec etenim tenuioris intestini morbum depellunt. Ceterum si ileus in tantum seuiat, ut aluum ducentia pharmaca inualida sint, egrotanti hanc infra scriptam glandem subdes. Salis fossilis drachmae decem, medullae cucurbitae syluestris drachmae duae cum semisse, scammonij tantundem, his melle liquigatis, informato glandes ad longitudinem longanonis, ac ita subijcito. At si nihil auxilium praestiterint, clysterem hunc lenem (ut sua mora feces emolliat) infundito, qui accipit, ficus caricas quinque, surfuris manipulum, altheae tantum.

PARA. IN NONVM

tantūdem, betæ folia decem, hæc linteo illi-
gato, ac in libris duabus aquæ ad dimidias
decoquito, deinceps per linteum colato, &
sesquidrachmam nitri, & olei sesamini vnc-
iam vnā illi adijcito, sicq; apparatus enemæ
inijcito. Verum si hoc infusum acrius reddi
desideres, iam comprehensę glandis drach-
mam & semissem ei contemperato. Cly-
ster strenue fæces subducens, & superfluos
succos abstergens, quo aluo medicamentis
non cedente, neq; aliis illis adiuuantibus
vrimur. Carnis cucurbitæ sylvestris drach-
mę decem, centauri drachmæ quinq;, vtriū-
q; cyclaminis speciei drachmæ duę, menta-
stri, rutæ, origani cuiusq; manipulus vnus,
omnia in aquę libris tribus ad duas tertias
decoquuntur, & percolato decocto, cōmiscē-
tur² resinæ cedrinæ, mellis singulorū drach-
mæ tres, castorei, sagapeni, opopanax, præ-
scriptę glandis cuiusq; drachmę duę, omni-
bus pistillo contusis & iam tepidis, clyster
inijcitur. Ceterum si aluus induratum, ac
quasi in nucleos diuisum stercus (quod Grę-
ci κνύδαλον appellāt) minime egerit, in clyste-
ris

† Sic Leo
uicen² al-
chitrā vo-
cat.

RHAEZAE DE MOR. CVR. .73.

ris vsu, donec illud expellatur, persistendum est. Siquidem comprehensum enema, in ilei intestini vitijs atrocibus ac vastis, & seuo colico affectu, qui cum magno ciborum prostrato appetitu, nullaq; per aluū deiectione, affligit, vtiliter subijcitur. Presentem quoq; tenuioris intestini affectum, præter tradita symptomata, foetidū ructus, & sæcum nonnunq; per os eiection, concomitari consueverunt, quæ quum hominem affligunt, mortē subinde minitantur.

Colico est
flatu.

Porro si ventris dolor, tam ingenti alui constrictione vacat, sed si flatibus distentus venter, murmure multo ægrum molestia afficiat, electuarium ex bacis lauri porrigitur. Hoc recipit, Foliorum rutæ aridorum drachmas decem, ammeos, cumini, ligustici, origani, nigellæ, cari Alexandrini, pulueris mentastri, dauci, acori, baccarum lauri, castorei cuiusq; drachmas duas, sagapeni drachmas quatuor, opopanax drachmas tres, excipiuntur omnia mellis æqua portione, & eius electuarij nucis auellane, aut alterius parue nucis Indicæ instar, indies datur, cum vini veteris & feruescenti

K vncia

ARA. IN NONVM

& Electua-
 ria uocata
 sub anti-
 doti noīe
 cōprehen-
 dere licet.

vncia, aut radicū incidētium decoctorū lu-
 ris vncia. Hoc & Electuario ad digerēdos fla-
 tuosos spīritus, nihil est efficacius. Præterea
 glandem hanc spīritibus depellendīs ac dis-
 cutiendis idoneam, aluo indito. Cumini, so-
 liorum rutæ viridīs vtriusq; tantum quan-
 tum manus apprehendit, vtriusq; cyclami-
 nis speciei drachmæ tres, nitri drachma vi-
 na. deterito hæc melle & lanam spongiamue
 illis circumlitam, in anum dimittito. Abdo-
 men quoq; penicillo, calidiore flatusq; dissi-
 pante liquore, imbuto, subinde foueto, ac irro-
 rato. Quinetiam agrum in labrum huiusce
 modi flatus discutiendī vim obtinens, dedu-
 cito. Si vero his malum non cesserit, cucurbi-
 tulas magnas cum flamma & leues toti ab-
 domini defigere, locumq; rudiori ac aspero
 linteo, perfricari præ fiat. Deinde crebræ in-
 unctiones, ex rutaceo oleo, aut alio huius in ca-
 lesfaciendo finitimo, non alienæ sunt. Iā quo-
 q; castorei & euphorbi vtriusq; sedrachma,
 liquore quopiam læuigata, clysteris forma v-
 tiliter infunditur. Qui autem hoc malo
 teneri consuevit, dum sanus est, a vini diluti
 &

RHAZAE DE MOR.CVR. 74.

& frigide aque potu, & herbarum, & lactis,
 & aliorum flatuosos spiritus gignentium a
 limentorum esu, se arceat. At vini meri potu
 vtatur. Philonium, quod ileosis ad discu
 riendos flatus, & soporem sensitiuaq; sacula
 tatis stuporem inducendum, propinatur, cu
 scilicet summis tenentur cruciatibus, animi
 q; deficientis suspicio ingruit. Piperis, am
 meos, foliorum rute, mentastri, castorei, bacca
 rum lauri, cumini cuiusq; vncia vna, opij, ma
 dragore, seminis alterci singulorum semun
 cia, subiguntur simul cum mellis pari mo
 do, porrigitur vero eius medicamenti ses
 quidrachma. Plerumq; etiam huic phar
 maco commiscetur, scamoniij tertia pars vna
 cia vnus, vnde & alium quoq; citat. F. Phi
 lonis vero Tharsei anodynnon habet, croci
 drachmas quinque, pyrethri vna, euphorbij
 vnam, spice nardi vnam, piperis albi, alter
 ci vtriusq; drachmas viginti, opij drachmas
 decem, excipe melle, & ad eos qui stercora
 in maximis doloribus per vomitum reijci
 unt, dato magnitudine fabae, ex ternis aut
 quaternis cyathis aquae frigidae. I

K ii Cæterum

Ex 9. secū
 dū locos
 Gale & 9.
 fermōe A
 etij, resiste
 ta defici
 ptio.

PARA. IN NONVM

Ceterum si dolori febris adsit, cassia fistula succo intybi decocto ac despumato, diluta; ægro offertur, potui quoq; syrupus violaceus dandus est. At cibis quibus herbae emollientes adiectae sunt, oleoq; amygdalarum dulcium prae paratis, enutrietur. Item leuiiores infusiones, vt ex oleo in quo foenogracum, aut alihæa ebullierint, & anserino adipe, ab inferioribus partibus egrotanti inijciuntur.

Fe sanguis
nit,

Porro si locus abdominis, qui a sinistro rene ad dextrum, per ventriculi fundum cincturae modo pertinet, tumidus conspicitur, & laxum intestinum quoq; inflammatione correptum apparet, sine mora aperta dextri cubiti vena, sanguis minuendus est, & cassia fistula herbarum refrigerantium succo subacta, subinde propinanda. Item si tenue intestinum inflammatione infestetur, eadem praesidia praestanda sunt. Cibus vero ægro huiusmodi colli vitio per circuitus quondam torqueri solito, conueniet, qui herbis aluum emollientibus prae paratus, oleum quoq; sesaminum in condimentum accipit. Ab omni porro acidorum, austerorum, crassorum, aluūq; astrin-

RHAZAE DEMORCVR. .29.

astringentium esu, in totum abstinendū ē.

Eum vero quem cum dolore flatus quo-
q; implicare solent, pulmētis aromaticis spe-
ciebus, aut calidioribus incidentibusq; semi-
nibus conditis, nutrire conuenit. Proinde
econtrario, ab olerum, lactis, & flatus exci-
tantium ciborum ingestione, abstinere ex v-
su est. Potui vero vinum vehemens incorru-
ptumq; propinabitur, aut hydromel, cui me-
dicamina incidentia excalefacientiaq; in cō-
dimentum iniecta sunt, ex quorum numero
piper est, porrigetur. Huiusmodi autem
hydromel, quod subiicitur est. Commisceto
mel is puri libram, aquę potabilis libris sex,
& tantisper dum zulapou crassitiem ambo
recipiant, decoquito, spumamq; detrahito, q̃
diligenter peracto, ad singulas libras hydro-
melicis, piperis contriti drachmas duas lin-
teolo illigatas, quousq; hydromel adamus-
sim decoctum sit, immittito, & vbi refrige-
rit, diligenter expressum linteolum eximi-
to, poscente quidem usu, eius portione propi-
nato. Eos quoq; quib; ex flatibus & cras-
sis crudisq; humoribus dolor esse consueuit,

strenue

Vide ratio
in do-
lorib; ex
flatibus

PARA. IN NONVM

strenue iuuat, ricini fructificis oleum, recens
 et seminum decocto contemperatum. Præ-
 sens quidem seminum ius accipit. Amme-
 os, cumini, ligustici, cnici, origani, nigellæ
 cuiusq; quantum trinis digitis comprehen-
 ditur, hæc aquæ libris tribus immissa, ad di-
 midias decoquuntur. vsus autem eius est, si
 ipsius vncijs duabus, olei ricini drachmas
 tres dilueris, pluribusq; diebus ea quantita-
 te, potui porrexeris. Verum si dolorem
 ardor concomitetur, sumito pruna viginti,
 ficus caricas quinque, vuarum passerum ab-
 acinis mundatarum drachmas quinque, deco-
 quito & percolato, ac posteaquam cassiam si-
 stulanti in eo decocto subegeris, secundo per-
 colum trañcito, & amygdalarum oleo adie-
 cto, potandum porrigit. Vel decoctum in
 capite de distillatione commemoratum, ei⁹
 loco offerro. Cæterum si aluus vehementer
 astricta fuerit, huic iuri adijciuntur siliculæ,
 turbit vtriusq; drachmæ duæ, & his simul
 decoctis, tantisper dum aluus respondet, vs-
 temur. Posteaq; vero cita ea profluxerit, po-
 lypodium, & turbit amoueunt. Puluis
 qui

RHAZAEDE MOR.CVR. .76.

qui aluum ducendo simul flatus, & grauitates reprimit. Turbit albi et amygdalarū dulcium oleo irroratī, ac in puluerē adamuſſim cōtritī drach. viginti, ſacchari drach. triginta, zingiberis drachmę decē, hui⁹ qdē pulueris vt plurimū drachmæ ʒ tres offeruntur.

ʒ Sufficeret
duz.

Catapotia quorū vnum deuoratū, ventrem deſicit, & appetitum incitat, & flatuosos ſpiritus grauitateſq; reprimit, ad hæc ciborum concoctionem ſuuat. Maſtiches, zingiberis, cinnamomi, caryophylorum, pæoniæ, piperis nigri, piperis longi, ſcammoni, ſacchari, violarum cuiuſque vncia vna, ſinguntur catapotia cicerum iſtar, & eorum vnum tranſglutitum aluum ſemel biſ ue deſicit.

¶ De ventris profluuiio. Ca.lxxii. A calido humore

QVando aſſumptus cibus ſolita mora in ventriculo non retentus, citius paululum immutatus egeritur, & ſi huic vitio inteſtinorum, & ani muſculorum ob excrementorum acrimoniā erofio, & ventris cruciatus affuerint, præterea quoque, ſi huius alui pfluuij excremēta ante ciborū ingeſtio

P A R A. I N N O N V M

2. Nos as
 ceroso vo
 cata her
 be vie
 mer.

 ingestionem excreta, sanie quampiam admix
 ta habeant, egrotanti ex immaturis vuls de
 cocctioe inspissatus succo, aut rebes, aut ma
 lorū punicorū cū spodij & rosarum vtriusq;
 drachma vna propinabitur. Passilli quoque
 ex spodio astringentes identidem vtiliter of
 feruntur. Cibi porro sunt lenticula cum a
 qua, aceto & croci momento decocta, & pul
 li cum aceto elixi, idemq; assi, & omphacino
 intincti. Potui vero rhus obsoniorum rosa
 cea aqua dilutum, aut malorum punicorum
 succus exhibebitur. Præterea cibus rhus ob
 soniorum in condimentum accipientibus ci
 babis, & breuiter tota victus rationem ad refri
 ctionē & astrictionē dirigere consilium est.

 A crudo
 & fri. suc
 co.

 Ceterū si absq; huiusmodi erosionē alius
 lubrica molesta sit, si quoq; quod fluxu ege
 ritur nullam sanie admixtam habeat, sed
 viscosum, & albidum glutinosumq; id cerni
 tur, præter hæc etiam, si inflammatio modi
 ca, siuis exigua & ructus acidi affuerint, la
 boranti betam, & sinapi, & salitos pisces
 aliaue incidendi vim possidentia, admini
 strabis, & deinde anethum simul cum salis
mo

RAZAE DE MOR. CVR. .77.

momento, in aqua decoques, & posteaquam percolaueris, adijcies percolato iuri, mellis quod satis est, & sic post incidentia pituitam ingesta propinabis, eoque pacto digito, aut pinna ori indita, vomitum prouocabis. At si affectus, ob humorum copiam ventriculi tunicis imbutam, illo curationis modo non conquieuerit, pituitam ducens, pharmacum præbebis. Cuius generis quæ iam subsequitur censetur. Aloës drachma vna, cucurbitæ syluestris carnis drachmæ quatuor, sacchari tantundem, tritbit drachma vna, ex his formantur catapotia, quæ vni propinationi sufficiunt. Ad hæc vomitu ex incidentibus sæpius vti expedit. Cibos autem, quibus æger vescitur, in muriam intingere iuuat, vt inde incidendi & calefaciendi vim obtineant. Proinde quoque cibis sale conditis, ac acri gustu præditis, breuiter suo calore appetitum incitantibus eduljis, opportune ægrum cibabis. Si id quod per aluum deijcitur, nihil superflui biliosi nihil saniosum, nihilque pituitosum admixtum habeat, vinum merum robustumque offe-

• Potius
tribus. & i
robusto
corpore.

Ex natu
ralium fa
cultatū i
becillitate
a fri et hu
mi. itepe.

PARA. I N N O N N V M

offeretur. Similiter electuariū quoq; ex thure prebetur, quod accipit, thuris drachmas decem, piperis, ammeos, spice, ligustici, anisi, nigellæ cuiusq; drachmas duas, balau-
stiorum drachmas decem, mellis dispumati quantum ad prædictas medicinas excipien-
das sat est. Huius vero antidoti vsus pro-
batur, quoniam ventriculū impense cale-
faciat, mirificeq; exciccet. Seminum quo-
que decoctum, ad plenioris intestini morbum
idoneum, propinabitur, viniq; meri potu
eger assuescit. Ceterum si assumptus ci-
bus crudus haudquaquam egeritur, sed ad-
sa quædam, & alba tenuisq; substantia ex-
cernitur, vna cum iocinoris imbecillitatis
notis, egro ex ferri stercore electuariū, &
id quod ex thure fit, porrigentur. Et pastil-
li quoq; quos calefaciēdo iocinori inscripsi,
& electuariū diacalaminthes, vtiliter ad-
ministrabuntur. Diacalaminthes autem cō-
positio est huiuscemodi. Foliorum rutæ, foli-
orum calaminthæ exciccatorum, ammeos, ca-
ri, ligustici, zingiberis, cinnamomi, longi pi-
peris singulorum æque portiones, omnia de-
ci

Ob ieco-
ris obstru-
ctionē &
attracim
becillitatē
sem.

Differt a
Galen. 4.
de sanita-
te tuenda.

cocto melle excipiuntur. Item præter hæc ad ea quæ calefaciendo corroborandq; iocinori comprehensa sunt, recurrendum.

Ex uentri-
culi et gra-
ciliū inte-
stinorum
vitiis.

Porro si commoratus affectus, iocinoris imbecilli indicijs caruerit, sique quod fluxu egeritur, tenue subalbidumq; vna cum ventriculi grauitate extiterit, malorum puniceorum puluis deuorandus dabitur. Preparatur autem, ex acinorum mali punici acidi, assorum & in tenuissimum puluerem actorum drachmis centum, cnici, seminis coriandri vtriusq; in aceto acerrimo maceratorum, ac deinceps torrefactorum drachmis viginti, & xylocaractæ, rhois Syrenici, balaustiorum cuiusq; drachmis decem, omnia in tenuissimum puluerem teruntur, qui deinceps transglutiendus offertur. Electuarium quoq; Cazi inscriptum, opportune offertur. Cuius mixtura in hunc modum se habet. Acinorū vūe passę i tenuissimū puluerē tritorū libra vna, baccarū mirtī aridarū, ac pari ratiōe subactarū librę quīq; xylocratę Nabathææ, balaustij seminis tamaricis, ammeqs singulorū drachmæ decē, confis-
plasma

& Opior
quorundā
signorum
astringen-
tium pu-
tamina.

PARA. IN NON VM

ciuntur omnia saccharo arūdinibus innato, seu apum melle quam exactissime spuma liberato, & deinceps huius portio pro morbi magnitudine præbetur. At si defluuij alui recrementa flaua, & anum mordicantia inueniantur, & eger siti febricq; corripitur, pastilli astringētes ex spodio, & aqua crudæ pollentē hordei, prospere portigentur. Pastil-
lorum autem astringentium ex spodio mix-
tura, ad hunc modum se habet. Rosarum ru-
brarum, spodij singulorum drachmę decem,
seminis rumicis, rhois Syrenatici, balauſtij,
gūmi Arabici cuiusq; drachmę quinq;, re-
diguntur in pastillos drachmarum duarum
pondere, quorum vnus vncia decoctio cydo-
niorum succo, & sextante succi plantaginis
dissolutus, potui datur. Aquam quidem pol-
lentæ hordei, hac ratione præparabis. Horde-
um confractum, in aqua quæ ipsum tegit, tã-
tis per dum aqua modice inspissetur, decoqui-
to, deinde percolato, & eius vncias quatuor
cum spodij, & gūmi Arabici vtriusq; drach-
mis tribus dilutas, porrigito. Quod si ven-
tris fluxui intestinorum exulceratio serpen-
do de

Ob bilis
copiā in
vêtriculū
& intesti-
na regur-
gitatem.

Dysſteria.

R H A Z AE DE MOR. CVR. .79.

do depascens, superuenerit, lapidis Armenij
puluerē deuorandū exhibeas. Qui cōstat, se-
minis herbæ pulicaris drachmis viginti, se-
minis plantaginīs drachmis decem, gūmī A-
rabici, lapidis Armenij vtriusq; drachmis tri-
bus, pulicaris herbæ semine torrefacto, om-
nia simul cum illo in puluerem subiges, ac e-
um in aurora drachmarum trium pondere,
cum discocto coroneorum succo, potui porri-
ges, ac somnū in futuro egro, tātūdē pbe offe-
res. Inter cibos qdē administrabis pulmen-
tum, cui punicorum malorum acini, & vuæ
passæ, & posca adiecta sint, præterea eū, qui
ex omphacino conficitur, & qui rhus Syre-
naicum in condimentum accipit. Similiter
quoque ex herbis aluum emollientibus, cū
rhoi præparatum edulium, & id genus alia,
edenda appones. Ad hæc pastillos de balau-
stijs continuæ leuitati intestinorum (quæ
Græcis λευκτερία dicitur) dicatos, si modo
aluus continenter fluat, propinabis, nec re-
fert, an eius ventris profluuij recremēta san-
guine tincta, intinctaue sunt. Recipiūt ita-
que pastilli commemorati. Gallarum, sili-
qua

Potui fac-
scissū por-
rectū ab
Alex. pro-
batur.

PARA. IN NONVM.

liquarum Nabathææ, seminis tamaricis, thuris, balaustij singulorum æquas partes, opij, gummi Arabici vtriusque partem dimidiam, his cydoniorum malorum succo aspersis, informato pastillos duarum drachmarum pondere, atq; vnum si neq; siti, neq; febris crucietur æger, vino læuigatum, præbeto. Præsentî autem febris, decoctione inspissato cotoneorum succo detritos, propinato. Sane hi pastilli in magnis & continētibus alui fluxibus, vt efficacissimi commendantur. Pastilli tenesmo sacri, qui

Tenesm^o. malignis flatibus, & murmure infestantib⁹, absente tamen calore, porrigendi sunt. Seminis hyoscyami albi, seminis anethi, seminis fœniculi, singulorum drachmę quinque, ameos drachmæ duæ cum semisse, opij drachmę tres, seminis apij drachmę decem. hæc vino subacta in pastillos redigito, ac vnum sesquidrachmę pondere vino læuigatum, potui offerito. Compositio electuarij de styrace, vetusto ventris fluori, & tenesmo cum flatibus malignis, absque febris, & ardore infestâte vtilissima, Castorei, opij, asari, styraçis

RHAZAE DE MOR. CVR. 186.

Syracis liquide, myrrhe, seminis alterci nigri, thuris cuiusque eque portiones, mellis quantum ad simplicium medicinarum exceptionem sat est, huius quidem pondus inter duas drachmas & tres, ut plurimum proportionabitur. Si tenesmus post decimum diem protrahatur fuerit, nec medicamina quicquam praesidi adtulisse cernantur, & egrum circa peccinem dolor aliquis exercet, ad subscriptum clysterem recurrendum est. Panacis, oryze, lentium, quibus tribus cortices detracti sint, rosarum siccarum, balaustrorum, calicium glandium cuiusque manipulus unus, omnia tribus libris aquae potabilis ad dimidias incoquantur, & deinceps percolantur, insuper sumuntur cerussae, cineris chartae Babylonicae, aut si eius facultas non est, cineris alterius chartae utriusque drachma una, lapidis Armenii sedrachma, vitellus cui assus induratusque, olei rosacei semuncia. haec omnia iam narrato decocto subacta, commixtaque, semel bisue clysteris forma, egrorum tantum infunduntur. Porro si tenesmus in vetustate incidit, ac nullus sanguis, sed rasura alba & mucosa, seminum cremori non absimilis, profuse

A putri
pituita,

PARA. IN NONVM

profluxerit, pharmaco putredinibus sacro capite quo gingiuarum putrescentium curationem persecuti sumus descripto, restitisse ad hunc modum vteris. Portionem aliquam eius medicamenti in paulo ante descripto decoctio subigito, & clysterem vnum atq; alterum in alium ex eo dimittito. Quod si alui profluuium vehemens erosio ventris comes sit, enema ex oleo rosaceo egelido, tanrisper dum curetur, subinde iniiciendum est.

Ad fri. af
sectum v
tile est.

Epithema quo venter vehementi & continuo profluuium afflictus, ac virium robore languidus, illinendus est. Galliae moschate, acaciae, cyperii, myrrhae, gallarum, cupressi, thuris omnium partes aequales, his vino veteri & subastringente, aut cotoneorum succo aspersis, venter crebro irrorandus est. Huic quoque nonnunquam panis bis coctus ex Syria commiscetur. Caeterum si morbum ardor concomitetur, epithema quod duobus scadalis, rosae a fibris liberis, lapide Armenio, nuce Indica, galla, pane bis cocto & succo malorum puniceorum acidorum, aut cotoneorum, aut succo myrtino, constat, praesidio erit. Si

RHAZAE DE MOR. CVR. .Si.

autem vehementi tenesmo æger tenetur, sæpeq; ad secessum properat, tamen nihil nisi forte mucosum quid egerit, glās ista subiicienda est, siquidem mirifice tenesnum senforiæ facultatis torporem inducens, sedit.

Thuris, lycij, croci, gummi Arabici cuiusq; drachma vna, opij drachmę duæ, informantur & glandes, quæ ano induntur.

¶ De urinae difficultate. Cap. lxxiii.

Quod si vrina modica excernit, aut in totū supprimitur, nullo tamen in inguinibus apparēte tumore, & nullo præfente dolore, qui aut renes, aut vrinae meatus, infestet, infra scriptis medicaminibus vrinae ciendæ vim possidentibus, subueniendum est. Cuius notæ, hoc quod modo subiicitur est. Seminis apij, nitri naturalis, rubi æ satiuę, apij Macedonici, baccarum iuniperi, seminis asari, ammeos, seminis foeniculi, spicæ, amygdalarum amararum cuiusque drachmę viginti, seminis melonum drachmę decem, cantaridum quarum & alæ & capita abiecta sunt drachma vna, ammoniaci drachmæ tres. Ammoniacum vino di-

L luitur

¶ Alex. ad nuclei pi-
nei mag-
nitudine
pauloue
maiores
eas fieri
præcipit.
A partiū
debilitate

¶ Fuch. 12
alas sing-
das autē
mat.

P A R A . I N N O N V M

Ab exter-
na causa.

Iuſitur, ac eo reliquis exceptis, formantur ſor-
mulæ auellanae nucis inſtar, quarum portio
inter drachmam vnam & tres vna propinati-
one ex cicerû decoctio offertur. Sane hoc me-
dicamen habitus molliciei, eiufdem laxitati,
hypofarcæ, eijciendisq; his quorum occasione
corpus exiccari conſueuit, accommodum cen-
ſetur. Si vrinae difficultas a caſu, aut ſor-
morum, aut ani circumiacentiumue partium
plaga, apprehendit, ægrotanti ſanguis axila-
lari vena peruſa (partita interim ſanguinis
miſſione) detraheretur, & locus affectus ege-
lida aqua, & calidioribus oleis ad medij di-
ei ſpatium irrorabitur. Aeger quoq; ad ve-
rinae excretionem cohortandus eſt, quam o-
ptime ſpiritus retentiõe, & muſculorum os-
cſto abdominis compreſſione, perficiet.
At ſi ſuppreſſio vrinae veſica plena ac inten-
ſa, moleſtet, præſertim poſt ſanguinis, aut
puris eruptionem, medicamina, quæ gru-
mos ſanguinis, & pus diſcutere colliquare
que ſolent, propinanda ſunt. Medicamen-
tum grumis ſanguinis, & pure veſicæ amouen-
dis vehementer generoſum. Cardamomi,
myræ

RHAEZAE DEMORCVR. .82.

Rhæzæ, rubiæ sativæ, qua vestes inficiuntur, baccarum iuniperi, ammoniaci, liquoris Cyrenæici singulorum æque portiones, ammoniacum scœniculi succo, aut simili aliquo læuigatur, & eo alia excepta in catapôthia digeruntur, ex quibus drachma vna quater in die, cum comprehensi seminum decocti vncijs tribus, propinatur. Syrupus quoque acidus aceto acerrimo præparatus, subinde porrigendus est. Ad hæc per syphonem aqua sale diluta, aut lixiuium opportune inijcitur. Compositio autem lixiuij ad id efficacis, ad hunc modum præparatur. Cineris † ilicis, cineris sarmentorum, scœcis vini vstæ, calcis cuiusq; debitæ portiones, his aqua quousq; tegantur, super additur, sicq; triduo seponuntur, deinde illis per colum transmissis, lixiuium reconditur, & eius modica portio per syphonem in vesicam demittitur, Cnici etiam folia, et blitum cum modico olei amygdalarum decocta affecto loco superaccommodantur. In solo præterea incessus, cui chamæmelum, stithas Arabica, sampsuchus & sisymbrium

allæ,
glandiū.

L ii inco-

P A R A. I N N O N V M

incocta sint, ægro strenue auxiliantur. Poterit quoq; huiusmodi solium ex brassicarū summitatibus, & blito, & stercore columbino in aqua decoctis, adaptari. Sane in his decoctis quoad per vires licebit, magno præsidio æger desidebit, atq; ex iam comprehēsis herbis, cataplasmata ac focius inguinibus & circumiacentibus partibus, vtiliter inducet. Quando autem solio insedit, ea quæ vrinas citant ac mouent, potui dare confert. Verū si hæc vniuersa inefficacia sunt, ad instrumentum vrinis eliciendis aptum (syphonem, aut catheram vocant) recurrendum est. Si vero vrinæ difficultas post calculi indicia oboriatur, ægrum supine procumbentem, pedes ac genua varijs motionibus in altum cōquassare concutereq; decet. Cæterum si vrina nō profluxerit, operæ precium erit, & hic quoq; ad depellendum calculum colli vesicæ orificio incumbentem, instrumento (quo in vesicam demisso vrina emollitur) auxilium præstare. Percauendum tamen, ne vesicæ ceruix inflammatione tentata, eius instrumenti dimissione irriteretur. Ad suppressam vrinā
inter

inter cetera mirifice conducunt, frequentes in labro calidiore infessus, & ex oleis calidioribus emollientibusq; crebra inunctiones. Item medicamenta vrinas mouentia epota praesidiū praestant. Maxima igitur diligētia ab acidorum, auiterorum, crassorumq; elu, egrotantem circumcidere, conducit.

¶ De renum & vesicae calculo. Ca. lxxiiii.

L Apidem vesicae declarant, continuę & gri pudendorum infrictiones, & ipsorum frequens tentigo, subitusq; ipsis obortus languor, praeterea cum crebra mingendi difficultate, vrinarum propulsio, in quo affectu longanum quoque a vesicae calculo compressum, interdum procidere solet.

A crasso
terreoq;
humore
igneo cali
ditate in
crassato.

At calculum renibus innatum, testantur laborantis cum vrinarum in principio suppressionē, vehemens renum & meatuum, per quos vrina e renibus in vesicam distillat, & circumiacentium partium, & inguinum dolor, & alui initio astricta, & ciborum nausea. Calculo quidem in vesica increto, haec infra scripta compositio utilis est, quoniam ad comminuendum lapidem etiam
veteris

PARA.IN NONVM

vetustiore, mirifice efficax est. Et ego quoque eius usu, magnum lapidem minori quadraginta dierum spacio, confregi. Habet autem ea se in hunc modum. Fructus balsami, seminis raphani, dauci, seminis apij Macedonici, corticum radicum opopanax, corticum radicum capparis, amygdalarum amararum, baccarum lauri, funi rotundi, cyperi, spicae Indicae, castae lignae, scolopendrij, seminis rutae sylvestris, gentianae, aristolochiae rotundae, asari, cardamomi, ammoniaci, sagapeni, bdellij, piperis, acori omnium aquae portiones, gummi in balsami liquore diluti quantum ad excipiendas medicinas sat est, ex his finguntur globuli, & singulis diebus eorum dragma seminum incidentium decocto soluta, propinatur. Nonnunquam & obulus cinerum scorpionum una cum eis porrigitur. Scorpionum porro cineres, in hunc modum apparari solent. Accipiuntur scorpiones, qui in ollam fictilem repositi, & olla diligentissime obturata, super tegulam infusum non usque adeo calidum dimittuntur,

Scorpio
num cine
res.

RHAEZAE DE MOR. CVR. .94.

tur, ibique ad sex horarum spacium sinuntur, & insuper exempti, ac in tenuissimum cinerem triti, vsui futuro reponuntur. At æger decocto cicerum, & cibis aromatibus feminibusque calidioribus præparatis, alendus est, a lactis vero, & casei aliorumque crassorum, & glutinosorum ciborum esu, reuocandus, quoniam eorum succus facile in calculum a caliditate induratur. Præterea conscendet æger solium, cui brassicarum folia, sampsuchus, & blitum, abrotanum, mentastrum, columbinum stercus, & medulla seminis cnici incocta sunt. Quinetiam inguina scorpionum oleo inungenda sunt, atque eius momentum in vesicam per syphonem infundendum. Oleum scorpionum. Aristolochiæ rotundæ, gentianæ, cyperi, corticis radicum capparis cuiusq; vncia vna, hæc in libra olei amygdalarum amaratū soli exposita, marcescere septimana vna sinunt, deinde expressa percolantur in cuius percolati libra inijciunt scorpionū decē, & iam oīa rursus in vasculū adamum occlusum, ad solem duabus hebdomadis

reponū

Virib
n te spina
chie respē
det.

P A R A. I N. N O N V M

reponuntur, dein per colum tranſiuntur, & futuro uſui reconditur oleum. Quum itaq; hoc genus olei q̄ optimum ac laudatiſſimū ad propoſitum affectum exiſtimatur, eius portio per guttulas in ægri penem poſiquā e ſolio deſcenderit, rectiſſime inditur. Ceterum ſi lapis in veſica impendio increuerit, ſi li nullum, niſi a manuali incifione, qua eueli queat, remedium præſtari poteſt. Verū huius ſectionem perſcribere, noſtri propoſiti libri limites haudquaquam admittunt.

Apud
Pau. li. 6.
ca. 60. &
Cel. li. 7.
ca. 26.

Cum autem renibus calculus innatus ē, æger in ſolium emolliendi vi præditum, frequenter ſe demittet, & renes, & lumbos, nup̄ enarratis oleis inūget. Ac lītea q̄ ꝑ calefaciēdi vī obtinentibus liq̄rib⁹, immerſa, dolenti loco admovebit, ex quorum claſſe ea, quę hæcenus enumerauimus medicamina ſunt. Potui autem calculos confringentia diſſecantiq; nō tamē manifeſto calefacientia, præbeto. Verum ſi euenerit calculum ex renibus per meatus vrinarios, quos Græci οὐρητιγες vocant, in veſicam decumbere, ea q; occasione veſicę ceruicem obturare, aut ſi
idem

idem a vesicæ calculo fiat, aqua calida paulatim ab alto pudendorum partibus donec rubore suffunduntur instillanda est. Porro extrema urgente necessitate, ad exteriora succio remedio erit, siquidem ea calculum dimouebit, & cum vrina fortasse extra penem simul alliciet. Quoniam si angulosus magnusue extiterit, inferiorem vesicæ ceruicis partem, qua scilicet eius corpus spectat, incidere necessitas iubet, vt hinc lapis manuali arte euelli queat.

¶ De renum & vesicæ inflammatione. Ca. lxxv.

Plegmonem renum, concomitatur febris inordinata, nec vsq; adeo ardens, sed quæ cum horrore, & rigore apprehendit, & frequens mictus, & partium dorsalium dolor grauis, vnde si quando æger dimouetur, in his partibus pondus tãquam ab illis suspensum, propendere sentit. Cum itaq; hæ notæ conspiciuntur, si modo nihil aliud prohibet, citra cunctationem in principio, axillari vena edirecto partis dolentis grauitateq; implicitæ secta, sanguinem agro minuemus. Regiõ quoq; dolenti forinsecus cataplasma

Renum;

P A R A. I N N O N V M

plasmata, & totus, qui mediocrem refrigerandi vim obtinent, accommodabuntur, quorū vsu propulso affectu, nulla suppuratio expectanda est. Ceterum si neq; dolor, neq; febris neq; grauitas horum applicatione conquiesce-
rint, vrinq; stillicidium egrū laboriose molestaueris, pus hac in parte colligi recte putabitur. Tunc itaq; cataplasma dorso induces, quod chamæmelo, semine lini & fursuribus, oleo sesami simul exceptis, constat. Iam etiam in folio ex emolliētibus herbis parato, in-
fessus summe profunt. Porro si eger pus min-
xerit, semina subsequente capite de vrinq; ar-
dore recensenda, donec imminuatur decre-
scatq; pus, agrotanti offeres. Deinde pastila
los capite sanguinis & puris mictui dicato,
inscribendos, exhibebis. Inflammationi au-
tem vesicæ, comites sunt, febris & continua ar-
dēs, & vrinq; reddendæ impotētia, & cerui-
cis vesicæ, & scæmorū imiq; ventris dolor.
Quirre venam hoc affectu implicito, incide-
re præsidio est, & alia quæ renum inflamma-
tioni accommoda retulimus, adhibere, consi-
lium est. Ceterum non omnis renum infla-
matio

Vesicæ.
& inter-
pres, con-
clusa.

Scirrhi re-
num cu-
ratio.

matio in vomitum transit, seu discutitur, seu aliqua in duritiem etiam occalescit, cuius gravitas in renibus tanquam ab illis suspensa, absente febre, molestiam infert. Huic igitur clysteres infusi ex fœnogræci, & seminis lini cremoribus, atq; ex chamæmeli, brasicarum, meliloti, maluæ silvestris & furfurum decocto, vehementer conducunt.

Nec minus irritatus vomitus, ob materię diversionem, adiuvat. Cataplasmata quoq; iam comprehensis emollientibus medicamentis preparata, regioni renum accommodata, non parum auxiliantur. Iam si urina modica egeritur, prædictis, ea quæ urinæ ciendæ sunt, accommode adijciuntur.

Sane huic quidem affectui non mediocrem curâ diligentiaq; adhibere cõuenit, quoniã huiuscemodi renũ durities (quã Græci *σκληρότης* appellant) aque inter cutē interdū autor, nō aliter q̃ iocinoris aut lienis, esse cõsuevit.

¶ De urina ardore. Caput. lxxvi. Ob urin

Q Vando ægro inter mingendum ardor, punctilesq; cruciatus in vesicæ ceruice oboriuntur, a salis, acidis & acris
a calidis succis acrimoniam
cir-

PARA. IN NONNUM

circumscindendus est. Et cibus alium emollientibus herbis præparatis, & iusculis, hisq; in leniendo vëtre paribus, alendus. Quin etiam ad reprimendum humorum acrimoniæ, subsequens medicamen porrigendū est. Seminis melonum excorticati drachmę triginta, seminis cucumeris citrinati, seminis cucurbitę domesticę, seminis portulacę, seminis papaveris albi, singulorum drachmę tres, seminis alterci albi drachmę duę, sacchari albißimi quantum simul omnia pendent, huius pulueris quotidie drachmę tres mane & tantundem dormituro ægro cum vncia synapi violacei, aut iozulapou offeruntur. Ad hanc quoque noxam q̃ diligentissime attentum Medicum esse oportet, siquidē vrinę acrimonia dum perseverat, vesicę & vrinę meatuum, exulcerationē creare solet.

¶ Ad sanguinē & pus mingētes. Ca. lxxviii.

Ob venę rupturam.

SI a casu, aut plaga alicui sanguis per penem erumpat, vena axillaris (partita interim sanguinis detractiōe) recte secatur, & pastilli ex succino potui porriguntur. Pastilli de succino. Succini, gummi Arabici

RHAZAE DE MOR. CVR. .87.

ei vtriusque drachmę quinque, balauſticorum
drachmę duę cum ſemiſſe, hypociſtides tan-
tundem, thuris drachmę duę, ſeminis opij v-
triuſq; drachma vna, rediguntur in paſtillos
ſeſquidrachmę pondere, quorū vnus quidie
rhois decocto dilutus, vtiliter offertur. Inter
cibes quidem, conueniunt glutinoſę & vi-
ſcoſę carnes cum rhu obſoniorū, aut ompha-
cino elixę, a falſis autem & acribus oportu-
ne eger arcetur. Verum iſcio loco cataplaſma
ex lapide Armenio, acacia, aloë & lycio poſca
exceptis, ſuperaccommodabitur. Si ſanguis
nis eruptione poſt acrium eſum, aut vini a-
crioris calidiorisq; vſum, eger angitur, vena
axillaris ad ſanguinis retractionem, inciden-
da eſt, atq; paſtilli ex ſuccino exhibendi. Vni-
uerſa autem victus ratio, plane eadem cū pre-
cedentium erit. Cęterum ſi ex vlcere ero-
ſione concitato, pus mīn xerit, paſtillos hos
præbeto. Conſtant autem, ſeminis melonum
ſeminis cucumeris citrinati, cucurbitę dome-
ſticę ſingulorum corticibus liberatorū drach-
mis viginti, lapidis Armenij, gummi Arabi-
ci, thuris pinguioris, cinnabaris ſingulorum
drachmę

Ex vena
rūcroſio-
ne.

P A R A . I N N O N V M

drachmīs decem, opij drachmīs tribus, seminis apij drachmīs duabus, fingūtur pastilli drachmarum duarum pondere, quorū vnus vncīa syrupi albi papaueris detritus, potui offertur. Quinetiam certici vesicæ, infra scripti collyrii portio, per syphonem vtiliter inditur. Collyrium de cerussa.

Cerussæ, sarcocollæ, thuris, gummi Arabici, opij, cinnabaris singulorum æque portiones, hæc succo portulacæ aspersa, in collyria rediguntur. Deinde per syphonem mulsæ egro in vesicam infunditur, ac ad vrinæ excretionem incitatur, insuper postquam vrinam eminxerit, huius collyrii portio assennino lacte soluta, per syphonem vesicæ infunditur.

¶ De his qui inuiti urinam reddunt.

Caput. lxxviii.

SI æger magnam vrinæ portionem emingit, nullam tamen inter egerendum acrimoniam ardoremue percipiat, aut si q̄ noctu se commingit, verum neque siti, neque aliqua corporis macie, colliquationeue inde tenetur, ea quæ vrinæ restringendæ sunt

RHAZAE DE MOR. CVR. .99.

sunt, vtiliter vtrisque offeruntur. Quale quod
iam subsequitur medicamen est. Glandiū
drachma vna, thuris drachmę triginta, se-
minis coriandri exiccati, gummi Arabici,
lapidis Armenij singulorum drachmę decē,
omnia in puluerem subiguntur, cuius ma-
ne drachmę tres, & totidem sub noctem, cū
momento decoctionis inule campanę, vt
medicamen ad vesicam vsq; deueniat, propi-
nantur. ¶ Quoniam vero hic affectus, renū
retentricis imbecillitatem, aut vrinę mea-
tum ambientem musculum relaxatum, aut
aliam quampiam frigidam, vel humidam
occasionem sui autorem habere solet, non
immerito his dum puluerem offers, ipsis
dicatis remedijs pspicere debes. ¶ Quod si
eger in hoc affectu, siti inexplibili, quæ ni-
mio cruciatu clamorē exciter, cōficiatur, &
patio protinus qualis assumpta est, per vri-
nas trāsmittit, hordei decoctū cū herbę puli-
caris seminis cremore, porrigendū ē, & æ-
ger immaturarum vuarum succo, & cibis
illo, & rhoi Syrenaico præparatis, & alijs
his persimilibus eduljjs, nutriendus est.

*nota hoc
auxiliū.*

diacētus

Lac

PARA. IN NONVM.

Aët^{ius} lac
scissū ha-
ber.

Rob vo-
cant.

Lac quoq; acidum ex quo butyrum coactū sit, & quæ ex hordeo cortice libero paratur puls, magno auxilio offeruntur. Potui autē decoctione ignis aut solis inspissati succi, q̄ acida qualitate pollent, propinabūtur, & ab omni exercitio, & mulierū concubitu eger arcebitur. Præclare vero faciunt hi pastilli potui oblatis. Spodij drachmę decem, seminis lactuce, seminis portulacę vtriusq; drachmę quindecim, coriandri exiccati drachma vna, rosarum rubrarū, lapidis Armenij singulorum drachmę quinq; , balaustij drachmę duę , camphorę sedrachma, teruntur in puluerem, & plantaginis succo excepta, digeruntur in pastillos, & eorum drachma maiorum punicorum acidorum succo subacta, porrigitur. Herbæ etiā infrigidantes, vt portulaca, plantago, & solatrum, commodere regionī superligantur. Ab omni q̄dem calidorum ciborum esu, & vino, ac his quę vrinas citāt, imprimis abstinere cōfert. Inter ea quæ stolidorum imperitorūq; Medicorum inscitiā, in hoc affectu delinq̄ solent, totius corporis tabes colliquatione primas

RHAZAE DEMORCVR. .89.

primas obtinet, in quā ægrū ppinatiōe calidiorū medicaminū et vrīnas promouētium, euestigio inducunt .

¶ De lūbricis in ano ac vētre hatis. C. lxxix.

QUī hoc malo torqueri solet, a crassissimis & glutinosis ac pinguib⁹ cibis, nimisq; alimentī infartiōe abstineat oportet, & indies panis offulas sinapi muriacq; immersas, ante cibos magna vtilitate assumet, siquidē ea ratiōe, lumbricos pcreari prohibebit . quoniā origo oīm triū generū lūbricorū, ex cruda, crassa pituitosaq; materia putredinis accōmoda, existit. Si tamē nihilominus intestinis innascent, nullum ab expulsiōne remediū est . Medicamen porro teretes, & longos rotundosq; lūbricos expellēs præparatur, ex semine ⚥ burungij excorticato, hoc est, erisymi, aut vt alijs placet, melisso-phylī, aut erucæ syluestris, quando scilicet ægro fame vexato, eius seminis drachmę septē lacte solutæ, porriguntur . Medicamentū aliud generosum, agens lumbricos . Burungij seminis excorticati, seminis nigellæ, turbit cuiusq; pares modi, lupinorū, nasturtij, se

Prolixiss
gie Aëri
ser. 9. cas
39.

⚥ Alij aB
rotanū in
terpretat
tur.

M i mins

P A R A. I N N O N V M

minis rubri ex Mecha (quod Arabes cābil
appellant) singulorū pars dimidia, oīa in pul
uerē subigunt. Exposcente aut vsu, eger per
triūm lac recēter mulciū & calidū bibet, et
deinde tertio die victu tenuissimo enutrit⁹,
cōmemorati pulueris drachmas septē lacti
adhuc ex vberibus calenti, et aceto iniectas,
assumet, idq; eo potissimū tpe, q̄ fames cruci
at. Ascarides vero vermes minuti ī extremo
lōganone et ani fibula nati sūt, quāobrē ibi
dē pruritū (cui⁹ grā anus subinde infricat⁹)
excitāt. Depellūt vero huiuscemōi vermes,
lana molli oleo ī q̄ porrū ebullierit, imbuta, ac
ī ani fibulā cū specillo detrusa, potest aut lana
tenera citri mali oleo, aut mētastri liq̄re, aut
memēto aloēs vaccīno felle soluto, inticta, in
anū etiā sibiijci. ¶ De hæmorrhoidibus, scissuris
& fissulis ani. Ca. lxxx.

Hæmorr
hoides.

DVm sanguis pur⁹ citra dolorē ab ano
p̄ certa itervalla emanat, minime sup
primēdus est, nisi forte sua copīa laborāt: s̄ vi
res deuicerit, siquidē huiuscemōi sanguis p
ruptio⁹, multis affectibus hoc vitio detētū,
imūnē reddit. Ceterū si eo sanguine ab oris
vena

RHAZAE DE MOR. CVR. .902

venarū tanq̃ ex capitulis q̃busdā surgētibus
profluēte, egrī robur deijcīt, suppressio ex ṽ
su erit. Proinde pastilli de succino, rhu obsoni
orū soluti, cōmode offerunt. Cibis aut̃ rhus
obsoniorū in cōdimentū accipiētibus, et suc
co immaturarū vuarū preparatis, hisq̃ p̃sīmī
libus, q̃b⁹ scilicet alendi facultas est, rectissime
enutrietur. Porro si vires in totū proferant̃,
expresso carnū, cui vt plurimū cotoneorū suc
c⁹, et vinū subastringēs admixta sint, alēd⁹
ē. Vinū q̃q̃ austerū p̃p̃nandū. Præterea iō
cinori emplastrum de spīca, capite de ietoris
doloribus inscriptum, vtiliter superaccom
modabitur. At si hæc inefficacia fuerint, cō
fectio ex ferri stercore apparata, porrigetur.
Ea accipit, myrobalanorum Indicarum,
belliricarum, emblicarum singulorū drach
mas quinq̃, spīcæ, iunci odorati, cyperi, zīn
giberis, pīperis, ammeos, thuris cuiusque
drachmas duas, stercoreis ferri in aceto septi
mana vna macerati, ac deīde cōbusti drachi
quindecī, excipiunt̃ oīa despumato melle si
mul cū myrobalanorū emblicarū decoctio iū
re, veluti cap. de melācholīa cōprehensum est.

M ii Huius

PARA. IN NONVM

Hui⁹ iuglādis instar quotidie exhibebitur, ea namq; confectio, e venulis ani, & ex ijs p quas menses mulieribus repurgantur, manantem sanguinem sistit. Præter hæc quoq; dsuturno ventris profluuiū, non medicci ea præsidio ē. Qd si excrescentia aliqua eminens, & magnos excitans cruciatus in ano oboritur, Verū a qua nihil resudat, cepe succū, aut fel vaccīnū modica lana illitū, ex crescentiæ applicato. Glandē q; oblōgā ex malo terræ cōparatā, in anum ægri tota nocte retinendā indito, & si forte fortuna glās ex ani sūbula pPELLITUR, rursus donec excrescētia incidatur, atq; adaperiatur sanguisq; pfluat, eam subijcito. Ceterū si quando cū vehementi dolore, inflāmatio quoq; ingens anū infestet, vena ægro secanda est, atq; ēplastrū infra scriptū superligandum, quoniā hoc probe hæmorrhoidū dolorem subleuat, potissimū si adiunctā habeant inflammationem. Accipito itaq; ad eius emplastri compositiōnē, iuris decoctionis meliloti, & chamæmelī tātisper dū tabuerint in aqua elixatorum, tantum quantum vola vna continere potes, & de-

Græci cō
dylomata
vocare so
lent,

R̄HA Z AE DE MOR. CVR. .91.

& deide cui assi luteum vnū, croci drachmā vnā, opij drachmas duas, seminis lini contriti, foenogræci, maluæ syluestris singulorū manipulū, excipito omnia sapa hoc est, decocto vīno, in quo bdellij drachmę tres dilutę sunt, iā postq̃ excreſcentiæ superficiē oleo seſami in quo gallinaceus adeps aut anatis solutus fuerit, inunxeris. prædicta ēplāstri modo adhuc egelida dolenti loco admoueto, extrinsecus betę, aut lactuę folijs tuendi gratia impositis. Aliud remediū dolorē inflāmationemq̃ remittēs. Cepam albā quā optime coctā, vna cū butyro vaccino tātis per dū emolliatur, conterito, & ita ambo, modice inferuefacta ano inflāmatiōe tentato submittito, id nāq̃ mirifice dolorem reprimīt.

Qđ si languētis anus scissuris, (quas Gre

Scissura.

ci ραγδαεις appellant) infestatur, quę excicata aluo ob sæcum duritiem cruciatus inferunt, catapotia ex bdellio subinde propinata, strenue auxiliantur. Quę constant, myrobalanorum nigrarū, chebularū vtriusq̃ drachmis decem, sagapeni drachmis tribus, nasturtij albi drachmis duabus, bdellij mollic-

ris

PARA. IN NONVM

¶ alibi tres.

¶ ad Al-
man. cō-
stat ex æ-
ruginis
et mellis
equispor-
tibus.

ris & pinguioris drachmis quindecim, oīa
porri succo, in q̄ bdelliū subactū sit, excepta,
in catapotia rediguntur, quorum dosis idem-
tūdem assumpta inter drachmā vnā et 1/2 qua-
tuor est. Si autem affectam partem ardor af-
fligit, vnguento de cerussa eam circumungi-
to. Absente quidem æstu, vngvine ex cameli
gibbi adipe, & bdellio præparato, patientem
partem illinito, quod Arabes vnguentum de
Sene vocāt. Huius autem compositio in hūc
modum se habet. Ceræ luteæ, olei sesami, a-
dipis anatis, medullæ cruris vaccini, adipis
ex cameli gibbo collecti, bdellij cuiusq; paria
pondera, bdellium seminis lini cremore sol-
uitur, & alia eo excepta, in linimentum re-
diguntur, cui nullum viribus par est. Quod
si ægrum profundiores scissuræ, a quibus
foetidum pus refudat, implicant, medica-
men acre capite de viceribus descriptum, ijs
admotum, & vt bīdum admotum sustineat
aeger, sollicitato. At si reliquæ aliquæ
per sudores erumpentes remanserint, rursus
tantisper dum locus exiccetur & nihil pro-
manet, nuper dictum medicamen superac-

com-

commodato. Si autem ea, quæ hac in parte innascuntur in tantum prominent propendentq, vt arida ac liuida fiant, butyrum tepidum donec liuor amoueatur, subinde ijs iungito. Verum si denuo huiuscemodi defluens sudor, ægrum in posterũ moleſtet, medicamen acre & ad saniosa vlcera optime faciens ſam ſecundo applicato. Sin autem nihil reſudat, vnguento de ceruſſa optime huiuscemodi excreſcentijs ſubuenies. Est & quando venulæ ſanguine manantes, & foris propendentes, ignito ferramento curantur, ſedeius rei tractationem, propoſitus liber minime admittit. Cæterũ inter reliquas corporis partes facillime anus fiſtulis tentatur, quum arcũs & oblongis ſiniſbus ex ſua figura ſubiect⁹ ſit. Fiſtulæ autem hæ nonnunq̃ penitus penetrant, nonnunq̃ cæcæ ſunt. Proinde ſi vtrinq̃ pertuſæ fuerint, ſtatus & ſicciora recrementa per eas protuduntur. Si autem vna tantum parte foratæ ſunt, neq̃ ſtercus, neq̃ ſtatus inde prorũpũt. Harũ autem præſidia perſenſere, plus e, pũ ſuſcepto hoc libro limitari poſſet.

Pau. li. 6.
Ca. 79.

Fiſtula.

Pulchre a
pud Pau.
li. 6. Ca. 66

Ve.

PARA. IN NONVM

Verum quia mortales pene omnes in harū curationibus, q̄ sæpissime in maximos errores labuntur, quibus non exiguę noxę subsequi solent, perstringemus illis, quę huic affectui congrua præsidia putamus, quaq̄ ratione a prædictis sibi præcauere poterūt exequemur. Existimamus itaq̄ fistulam vtrinq̄ pertusam, & in ano penitus delitescentē, nulla rōe esse ferro contingendā, siquidē in his ferri incisio, stercoris præter voluntatem egestionem concitat, licet & aliud quoq̄ sit, prohibens fistulam perfossam ferramento tentari, nimirum quum quoad vixerit eger, hoc in statu a ferro non lēsus, permanere possit, nullam inde scilicet insignem uoxam præter saniei resudationem, percepturus. Verū si id quod e fistula profunditur acre & mordax odoreq̄ foedum existit, cuiusq̄ copia indies increscit, fistula putrida quę herpetem exedentem sibi comitem habet, egrum infestat. Cui medicamine acri, erodenteq̄, & deinde deperditam carnem restituyente, priusquam malum dilatescat augeaturq̄, subuenire debes, antea tamen leuiore quopiam tentato.

Porro

Porro si id quod resudat exiguum, nec mordax, nec odore foedum fuerit, siq; malum nō serpsit, nulla inde prāter resudationem et fluxum habenda suspicio est. Poterimus tamen huic tantisper dum exiccetur, & subse-
derit, & nisi per longa interualla quicquam resudauerit, subuenire, atq; rursus vbi sanies emanauerit, prāscriptum medicamen ad fi-
stulas, huic quoq; fistulæ accommodare, eaq; ratione tota ægri vita, blandire illi nitemur, nullam inde notabilem noxam ægrotante percepturo. Ratio autem administrandi me-
dicaminis hanc censeto. Ante omnia fistu-
lam, donec quicquid in ea conseruatum sit profluxerit, comprimito, deinde collyrii ca-
pite de oculi fistula inscripti, portionem ali-
quam succo plantaginis, aut pluuiāli aqua
læuigato. iam si fistula specillū recipere pos-
sit, specillum molli lana inuolutum hocq; li-
quore imbutum, fistulæ imponito. Si autem
ob angustiam, aut loci distantiam, fistula spe-
cillum recipere nequeat, resupinato ægro al-
troq; foemore puluinari incombente, colliri-
um succo plantaginis, aut illi simili solutū,
gutta

P A R A. I N N O N V M

guttatim p̄ interualla fistulę immanare fini-
ro. Hoc quidem tribus insecutis diebus ma-
ne, & sub vesp̄rā, opportune perages. Præ-
terea in aqua æneo vase calefacta inessus, &
ex eadem lotiones, ex vsu erunt.

Ani.

¶ Ad procidentiam ani & vuluę. Calxxxii.

Si anus inflammatione liber p̄cidit, itaq;
se habet, vt impulsus in pristinū locū p-
trudi ac retineri queat, sumito cerussę, balau-
stij, galliarū, aluminis, sibiij singulorū pares
modos, & ea in tenuissimū pollinem deteri-
to, procidentiq; ano inspargito, ipso prius o-
leo rosaceo calēte circūlito, aut vino austero
deteriso. Deinde suo loco repositum anū, deli-
gato. Id tamen propriissime postq; æger ex-
creuit, tentabis, ne statim ad egerendū neces-
sitas ipsum vrgeat. Sumuntur quoq; ad præ-
sens vitriū, gallę balaustia, glādularū calices,
myrri folia, quę simul aquę donec ea rubescat
incoquant, & deinde ex huiuscemōi decocto
inessus, & lotiões parant. Ceterū si an⁹ ob
inflammationē tumidus, imponi nequeat, e-
ger in aquā calidam conscender, & ei ad tē-
pus immorabitur, atq; anū cera, cui chamæ-
melinū

melinū oleū, aut anethinū contemperatū sit,
 illinere quousq; reponi queat consilium est.
 Postq; vero recēdi potest, supra præscriptis
 astringendī vim possidentibus pulueribus,
 & fasciis illi rei adaptatis, vtendū erit. Vte
 rus vero si declinauerit, eadē ratiōe illi sub
 uenire decet. At in hoc vitio vinculis fortio
 ribus vti, & ægram supinam & eleuatīs fœ
 minibus ijsq; sibi mutuo innitentibus, de
 cumbere, necessarium est.

Vuluz.

Græci ad
 id pessis
 astringenti
 b^o vtutur

¶ Ad menses confertim erumpentes sistendos.

Caput. lxxxii.

IMmoderate profluentibus mensibus re
 tinendis, pastilli ex succino, astringente
 quopiam liquore lauigati, atq; septimana v
 na ita propinati, optime faciunt. Quibus si
 non conquieuerint, confectio quæ ferri ster
 e^o accipit, exhibebitur, & vena cubitū perre
 ptans, opportune (partita interim sanguinis
 missione) incidetur. Cucurbitulæ quoque
 sub mamillis infigendæ sunt, & cibis au
 steris vtendum. Summe etiam facit medica
 mē hoc in ægre sinū immisum. Thuris, ba
 laustij, gallæ, stibij, acaciæ, aluminis singu
 lorum

Ob tenuē
 et morda
 cē humo
 rem.

P A R A. I N N O N V M

lorum æque portiones, his in tenuissimū pol-
linem redactis lana quæ ad pectus sat est,
eo puluere circumlinitur, ac ita in mulieris
pudeum inditur. Epithemata quoque capi-
te de ventris profluuiū comprehensa, ingui-
nibus & lumbis inducere, & in aquam æ-
neo vase calefactam conscendere, opportunū
est. Porro si hæc non profuerint, acutior pes-
sus, ut qui crustas inducit, in vteri collum
diutius retinendus, subiicitur.

A costipa-
tis frigore
mentibus,
aut crasso
sanguine,

¶ Ad suppressos menses citādos. Ca. lxxxiii.

C Vm menstruę purgationis strangula-
tui magna subsequitur noxa, pastillos
ex myrrha porrigito. Recipiunt autē. Myr-
rhæ drachmas tres, seminis lupini adamulli
contriti drachmas quinque, foliorum rute, me-
taltri, pulegi, cumini, rubiæ satiuæ qua ve-
lites inficiunt, liquoris Syrenaici, sagapeni
opopanacis singulorū drach. duas, his bacca-
rū iuniperi iure subactis, informant pastilli
duarum drachmarum pondere, & vnus iu-
re decoctionis baccarum iuniperi detritus,
in die exhibetur. Sane hoc medicamen adeo
inducendis mensibus pollet, ut etiam foetus
educat

educat, & inter primos dies conceptionem facile impediat, si quæ eo eidentidem vtatur. Ad hæc cucurbitulas popliti agglutinare, ac venam interiorem malleolum perreptantem, aut poplitis incidere confert. Postremo foeminibus cucurbitulas tum cutis incisiõe defigere, non infimum auxilium præstat.

¶ Ad uulvæ scissuras. Caput. lxxxiiii.

HIs curandis, medicamen anî rimis, seu fissis sacrum, ex usu erit. Præparatur quoq; ad idem pessus ex anatis adipe, œsypo hoc est, lanæ succidæ sordibus, cruris ceruini medulla, hæc cera oleo lilij, aut narcissi subacta excipiuntur, atq; ex ijs formatus pessus in ægræ sinum dimittitur, dummodo neq; febris, neq; ardor ægram molestat. Quoniam si rimis æstus cum erosione adfuerit, oleum rosaceum illitum optime facit, nec min⁹ quoque ex cerussæ vnguento pessus, subdit⁹ iuuat. At si vehementior calor ægram affligit sumito portulacæ, aut lactucæ succum, aut herbæ pulicaris seminis cremorem, singitq; laminam plumbeam leuitati marmoris cui colores interuntur similem, & illi in circui

PARA. IN NONVM

circuitu labrum inflectito, ac deinde dictorum succorum aliquem lamine infundito, & correspondente leuitari pistillo plumbeo, laminam donec succus debitam spissitudinem recipiat, plumbiq; non exigua portio ipsi admisceatur, terito. Iā ꝑ illi succo rosaceū electū admisceto, ac informato pello, in agræ sinū ipsū subijcito. Hoc enī remediū vteri cācro exulcerato, eiq; cōsimilibꝝ vi: ijs auxilio est.

¶ De uulue inflammatione. Caput. lxxxv.

ꝑ Aëtius
μολυσ-
σου χυ-
λός vocat

† alias hu-
merali.

Inflammationem si febris ardorq; conco-
mitetur, sanguis ex † axillari minuendus est, & agra pusana enutrienda. Renibus quoq; & lumbis, & foemoribus, & sumini epithemata calidioribus tumoribus dicta, superaccommodabimus, & locum alijs refrigerantibus (a forti ligatura abstinētes) vehementer infrigidabimus. Verum si febris & æstus conquiesuerint, ac aliq; inflammationis calidæ reliquæ in duritiem occallescentes supermanferint, liquidis & emollientibus vnctionibꝝ ac iniectionibus per inferiora vtendū erit, & mulier in decocta suppurandi emolliendiq; vi pollentia desidebit.

Apud Ga-
l. de arte
curatiua.
reputiēs
ēplastrū.

Pellus

RHAZAE DE MOR. CVR. .96.

Pellus iduratas vteri inflamationes emolliēs,
ac ei⁹ cruciatib⁹ leniēdis pedetentiq; sedādis
quā aptissimus. Adipis anatis, medullę cru-
ris ceruini vel vaccini, bdellij molliusculi, cro-
ci, lutei oui assi, facis olei semis lini, fęcis o-
lei lilij sigulorū pares modi, subigūt in sapa,
aut alio quis dulci vino, figitq; pessus dolori
bus mitigandis & vuluę duritię emollien-
dis, maxime opportun⁹. Cōducūt pręter hęc
inseffus in decocto fęnogręci, seminis lini,
chamęmeli, meliloti et brassicarū sūmitatū,
quę singula p se, aut simul omnia iocoquūtur.

¶ De exulceratione, abscessu & cancro uteri.

Caput. lxxxvi.

VTeri exulcerationē testat pus, aut sani-
es a vulua pfluēs. si itaq; prōpta in cō-
spectū venerit exulceratio, et pus aut sanies
a primis partibus pfluxerit, nullaq; cauitas
foeda putridaue egrā molestauerit, accipito a
loē, thus, myrrhā, cinnabarī, sarcocollā, et ea
in pollinē detrita, laborātī parti inspargito,
tātisper dū solutionē vnitatis puluere illo re-
stitutā videas. Aut eū puluerē liqre aliquo
psusū, i vnguētī formā redigito, ac ita vtire.

Sin

P A R A. I N N O N V M

Sin autem altè pus profluit, pello ad sanguinis & puris eruptiones inscripto, & succo plantaginis soluto, in vterū clysterem infundito. At si quod effluit foedū malignoq; odore fuerit, pessum secūdū priore acriorē dictoq; modo leuigatū, in vuluam indito, prius tamen vterō mulla per æneū oricularium clysterē immissa, abluto. Porro si præter materiæ fluxū, cruciat⁹ pūctiles & tumor durus, qui tactu deprehēdi possit, adsint, magno studio ne locus acrioribus irretetur, præcauēdū est. Proinde succo plumbi, quē attritu supra apparauim⁹, aut cerussę vnguēto opportune vtemur, venāq; cubitum perreptantem vtiliter incedemus. Est præterea ægra ab his que atram bilē accumulare solent, & aromatib⁹, & seminibus calidioribus, & incidentibus, quibusq; cōdita calidiora apparari solent, arcēda.

¶ De vuluæ strangulatu.

Caput.

lxxxvii.

Ex vitiato
semie, aut
mensibus.

SI quando mulierem diutius sanguinem menstruū retinuisse acciderit, ac ad multum interuallū virū non admisisse, quum tamen ad venerem ea procliuis exriterit, præterea

terea si grauitatem & dolorem in demissio-
ribus suminis partibus perceperit, ad hæc si
quendam veluti ad superiora ex pubis parti-
tibus contractum senserit, animi deliquium
fortasse hæc comitabitur, & veluti emortua
morboe comitali correpta mulier proster-
netur. Vnde quoq; ægerrime eam aërē in-
spirare, vel arterias pulsare, percipiemus. Et
forsitan his accidentibus oppressa suffocata
peribit, fortasseque (licet difficulter) sanitati
recolligetur. Quapropter hūc affectum sta-
tim atq; implicat propellito. Incipito itaq;
curationem, a pedum, & crurum frictio-
ne, eorundemq; dolorificis vinculis astrictio-
ne, secundum hæc per magnarum cucurbitarū
in pube, & foeminibus agglutinationem.
Obstetrici quoque digitum odorato oleo in-
tingere præcipite, vt eo in vteri collo inserto,
& peniti⁹ quasi ad vuluę os demisso, circū-
linitu, & titillatione, corruptum semen eli-
ciat. Naribus etiam struthium inspirādum,
ac auribus† platæ voces sonore inclamādæ
sunt. Item nihil iucundo gratoue odore pol-
lens naribus admouendum, imo odorata, cu

Dū est sa-
tis virum
Cel. venā
fecat.

† Aliqui
certas ridi-
culas vo-
ces præ-
scribunt.

N iusq;

ARA. IN NONVM

ius generis gallia moschata est, recte abijciunt. Inguina aut, ac illis contermina loca, odoratis epithematis foueo, & ea quę tetro foedoue odore sunt, naribus inducito, cui⁹ notæ sterc⁹, castor ũ, sulphur et extr⁹ cū exluerna linimentū, cēsentur. Ceterū muliere valetudini restituta, iā cōprehēsis pręsidjs, ne denuo affectus exerceat, eā a noxa pręseruare profuerit. Proinde si morbus post mensiū suppressiōē nascat, ea quę mēsisbus eiēdis sunt prabeto. Itē e pedis venis sanguinē detrahito, inguinibusq; ac coxis, cucurbitulas affigito. Perro si post diu intermissum concubitū (q; subinde huius mali autor esse consuevit) huiuscemodi noxa inuascrit, summe auxiliabit cū viro coitus, aut si eius occasio non datur, obstetrix pręscripta ratiōe interpositis interuallis semē prouocabit. Vel semē extinguetia, quę suo loco executus sū, offerito. Itē pastillos ex myrrha capite deti rādis mensibus inscriptes porrigito.

Pli. addit
capillos
mulieris
trematos

Ex mulie
br semine
et affluet
h⁹ mēsis⁹.

¶ De mola uteri. Ca. lxxxviii.

INterdum mulieres affectus quidam anigit, qui per initia concepti foetus suspicio

tionem adfert, illis enim venter intumescit,
 & decolorata apparēt, mensesq; supprimū-
 tur. Motus tamen qui in hoc morbo est, ab
 eo qui ab infantibus fit, dissimilis percipit̃,
 mola namque digitis violēter iniectis, a suo
 loco dimouetur. Cāterum circa finem mali
 cum magnis laboribus doloribusq; infor-
 mem aliquam carneā massam, non aliter q̃
 li parerent, educunt. Interim autem interdū
 soli flatus, & humorum copia ab vtero pro-
 rumpunt, vnde venter sūdere solet, atque e-
 numerata symptomata ab egrotāte auferri.
 Perro postquam tempus, quo foetus vtero
 gesti moueri solent, lapsum est, pastilli ex
 myrrha seminum incidentium decocto lae-
 uigati propinandi sunt, oleumque † balsa-
 mi inguinibus, & vteri collo inungēdum.
 Ad hęc pessus, qui ruta et mētaestro cōstāt,
 & alios capite de mensium prouocatione,
 foetusq; educatione conscriptos, subiicere con-
 uenit. Quantitas quoq; catapotijs foetidis
 vna vice porrigendis, inscripta pluries pro-
 pinabitur, siquidem his omnibus, affectae
 propedsem liberabuntur.

Quē mola
educunt,

† alias chē-
sim hoc ē
ligustici.

[A R A . I N N O N V M

Laxato,
aut rupto
ad uafa fe
minaria
peritonæ
o.

¶ De *ramicum* generibus. Ca. lxxxix.

SI alicui in abdomine pars aliqua promi
net, quæ resupinato egro, & leniter digi
tis parti admotis, sidit, quæq; rursus seden
te egro, prouoluitur, affectus *ramex* dictus e
grum molestat. Quocirca hoc morbo impli
citus, a vehementi motu, nempe cursu, saltu,
clamore & id genus alijs, præsertim post in
gestum cibum, cohibendus est, ac a fabarum
& imprimis phaselorum, lenticulæ, oleorū
horumq; quibus inflandi vis adest comme
stione, omnino arcendus. Verum inter cæte
ra maxima laboranti sollicitudo, ut alu⁹ cita
fluat, habenda est, siquidem ea ratione, foras
sis quo minus doleat præcauebit. Præter hæc
loco deligaturam conuenientem, præcipue
dum occasio motum præcipit, accommodare
confert. Tamen si vehementius venter emi
net, & grauat, a motu omnino abstinendum,
nisi forti fassia inguinibus præcinctis. Em
plastrum ad *ramicem*. Gallarum cupressi v
triusq; partes duæ, myrrhæ, cyperi, sâpsuchi,
acaciæ, thuris, gummi Arabici cuiuslibet
pars vna. gummi vino liguatur, & reliqua
in

in puluerem probe coacta, illi adhiſciuntur,
deinde contuſa, & reſupinato ægro admota
recte deligantur, & inſoluta ad † triduum,
aut quatrimum ſinuntur. Tunc itaq; rur-
ſus ſupino procumbente egro, ſaſcia laxatur,
eoq; emplastro abiecto, aliud in eius vicem
applicatur, ea namq; ratione ne dilateſcat ma-
lum, cauetur. Quum ramex ad teſtes perti-
net, ſcrotum increſcit ac intumet, idq; vel ob
coaceruatos flatus, vel quempiam humorem
ibidem collectum, aut propter inteſtinū al-
quod in eam partem deuolutum. Si itaq; ob
prolapſum inteſtinum contingit, grauis &
excrutians, tactuq; indolens ramex erit.
Proinde illi eandem quoq; quā preſcripti-
mus victus rationem inſtituemus, ac paulo
ante dicto emplastro ſuperaccommodato, lo-
cum continuo ſaſcijs conſtringemus, ſiqui-
dem ramex vinculis non compreſſus, indies
magis dilateſcit augeturq;. Si vero ob co-
ceruatam humoris colluuiem euenerit, locus
lucidus, terſus ac intenſus conſpicitur. Huic
itaq; aquoſo ramici epithema capite de aqua
ſubter cutem ad ῥακίτην deſcriptum, circum-

† alias ad
ſex, aut ſe-
ptē dies,
nec male.

PARA. IN NONVM

linendum, aut potius emplastri modo super
accommodandum. In hoc praesenti affectu,
aqua interdum ad inferiora procumbit, per
que etiā nonnunq̃ refudat, & aliquando par
te scalpro pertusa, profluit, quibus occasione
bus eger ad tempus malo liberatur, at tem
poris successu morbus repetit. Proinde post
effluxum humorem, egrotāti ignis ferris,
& medicamentis siccantibus ac a
stringentibus, succurrendum est. Quoniam
illorum remediorum usu, mali restitutio fit,
nec alias huiusmodi noxa a gri tentantur.
Cæterum harum manualium curationū tra
ctatio, propositi libri institui non est.

Apud Pau.
lib. 6. Ca. 62.
Cel. li. 7. ca
22.

Quando autem huius affectus, flatuosus spi
ritus autor est, locum perfricare bene facit,
& oleo sambucino in quo castoreum & eu
phorbium laevigata sunt, recte pars tumida
subungitur, ac in penem quoq̃ guttatim hu
ius portio, commode per syphonē instillat.

¶ De podagra, reliquisq; articularijs morbis.

Caput .xc.

A calidi
humoris
affluxu

SI quando articulos dolor cum tumore
exerçet, & tactu locus calidus, coloreq;
rubro

RHAZAEDE MOR.CVR. 100.

rubro perfusus percipitur, agrotanti si dextro pede laboret, ex extrema dextra manu, aut cubito, si sinistro ex summa leuamatu, aut cubito, sanguinem detrahito.

Partem quoque affectam, ad reprimendum humorum influxum, doloremque remittendum, hoc epithemate irrorato.

Rosarum rubrarum, sandali rubri, nucis Indicæ, glaucij succi præparati, lapidis Armenij, opij singulorum aquæ portiones, his aqua & aceto subactis, epithema inducitur, ac ne concalescens noceat subinde repetitur. Item herbæ pulicaris semen aceto maceratum, & chartæ, vel alicui linteo ad id idoneo industum, tantisper dum tepuerit, dolenti parti superaccommodato. Quando autem tepuerit, illo amoto, in eius locum aliud applicato. Ad hæc alluum myrobalanorum & hermodactylorum iure desicito. Præparabis autem huiusmodi ius hac ratione. Accipies myrobalanorum citrinarum drachmas quindécim, pulueris turbit, oleo amygdalarum dulcium circumliti, filicule quam Græci πολυπόδιον vocant) vtriusque drach

PARA. IN NONVM

drachmas tres, foliorum arboris senæ drachmas quatuor, seminis fumariæ herbæ tantundem, hermodactyli albi, seminis intybi, seminis apij, rosarum singulorum drachmæ duæ, omnia in tribus libris aquæ, ad duarum consumptionem decoques, & insuper manibus adamussim confracta percolabis, ac eius excolati iuris vncias sex, aut septem cum sacchari albißimi drachmis decē, prospere porriges. Verum si quis præsens decoctum fastidiuerit, catapotia præbeto, quæ lecto decumbentes surgere, moueri, & obambulare faciunt. Compositio quidem eorum in hunc modum se habet. Aloës drachma vna, scam-

* Inter
pres male
quartā p.
te drach
mæ ver
tic.

moniꝝ ꝓ obolus semissis, rosę rubræ contritæ obolus vnus, hermodactyli albi drachma semis, redigito hæc in catapotia, ac vna vice porrigito, habito interim respectu virium ægroti. Ceterum eger cibus infrigidantibus, & austeris enutriendus est, & a vini potu & carne, hisq; quę melle parantur, circumcindendus. Cum vero tumoris ardor inflāmatioq; conquieuerint, his quæ calidioribꝫ tumoribus discutiendis sunt, affectus sanabitur

tur. Eius quidem notę hoc est. Cera oleo lilij soluta, succo scœnogręci, & seminis lini commiscetur, simulq; ad debitam mixturam pistillo teruntur, & deinde epithematis instar, egrę parti accommodantur. Interuallis vero quibus sanus, ac ab accessionibus eger liber est, venę sectione circa tempus quo malo torqueri solet, & potissimum in vere est vrędum, ac alius his quę flauam bilem purgant deijcienda, atq; a vini, & eorum quę melle apparantur, & carnis vsu abstinendũ. Proinde cibis acidis & austeris hisq; frigiditate paribus, enutrietur. Porro partes huiuscemodi vitio cruciari solitas, paulatim a consueto exercitio, dissuescere confert, idque potissimum, dum accessionis tempus expectatur, & corpus & venę sanguine turgēt, & si a venę sectione, atq; alui solutione, ad longum interuallum æger sibi tēperauerit.

Huius morbi p̄seruatio.

Cæterum si quando articulorum dolorē neq; ardor, neq; rubor concomitetur, & eger frigida temperie sit, locusque tactu algidus percipitur, inter curationis initia, catapotia maiora de hermodactylis porrigenda sunt.

A crudo humore.

Quorum

PARA. IN NONNUM

Quorum mixtura talis est. Hermodactyli, satyrj, chamæleæ cuiusq; æ drachmæ quinque, hieræ picræ drachmæ decem, cucurbitæ sylvestris, centaurij minoris vtriusque drachmæ quinque, euphorbij drachmæ duæ, turbit drachmæ decem, thapsiæ Indiæ, zingiberis, sinapis, piperis, castorei singulorum drachma una, omnia simul rosarum melle excepta, in cataportia digeruntur, horum pondus a drachmīs duabus cum semisse, ad tres datur. Sane mirifice hæc cataportia profunt, siquidem ægre surgentes ad

Utuntur
multi cat.
Me. ex her
mo. quia
non adeo
vehementes,

ambulationem promouent. Epithema ad frigidum pedum articulare morbum, efficax. Styracis liquidæ, castorei, euphorbij, myrrhæ, aloës acaciæ singulorum æquæ portiones, his vino veteri affuso, formatur epithema. Cæterum dolore se remittente, laboranti calidæ aquæ ab alto instillatione, & olei liliorum inunctione, prospere subueniemo. Emplastrum præterea ex bdellio molli, styrace, foenogrecō, semine lini & ammoniaco præparatum, vtiliter dolenti parti inducemus. Adaptabimus autem id ad hunc modum

dum, ammoniacum cum bdellio vino veteri diluimus, hisq; linteo aliquo accommodatis, loco instar emplastri superponemus. <sup>Id Tophi articu-
culorum.</sup> quidē articulorum vitium, quod in lapideam duritiem occalescit, quodq; cola, & articulamenta tophis adimplet, presentis affectus, de quo iā paulo ante locutus sum, species censetur. Quare quoq; hoc vitio implicitos a fastidiosa ciborum repletionē, frigide potu, cibis glutinosis et crassis, & crebra temulētia, merito arcere cōuenit. At postq̃ sanitati restituti fuerint, mediocre exercitiū, <sup>Malis fri-
humore p̃
seruatio.</sup> praesertim ante cibū illis imperandū est, & a venere imprimis ventriculo cibis distenso, sunt cohibendi. Ad hęc a balneo dulcis aque abstinere, & post assumptos cibos quiescere consiliū est. Potui vero eis vinum merum ac vetus, & ea quę vrinas citāt medicamīa, dū sani viuūt, porrigēt. Affect⁹ a parte im- ^{Coxēdix.} plicita coxēdix apellat⁹, is dicit⁹, q ab osse lato et coxēdicis p̃ foemur ad gēua vsq; p̃tēdi ē, q̃q; nōnūq; etiā in lōgū virgē instar, p̃ totū crudimiss⁹ ad sūmū vsq; pedē p̃git. In hoc ^{A s̃guie,} itaq; affectu, si i tēpie calor p̃ualet, vi i req; colora

PARA. IN NONNV M

A crudo
succo,

coloratæ sint, sanguis primū vena cubitum
perreptante lateris dolentis pertusa, ob ple-
thoriā, minuendus est, deinde poplitis, aut ea
quæ exteriorē malleolū perreptat, diriuatio-
nis grā secta, opē fert. Item ea quæ ad calidū
articularem pedum dolorem inscripsimus,
inducere parti affectæ, summopere confert.
Cæterum si eger frigida temperie fuerit, co-
lorq; exalbidus & aque subter cutem simi-
lis, subinde raphani decocto, & syrupo aci-
do, vomitum iritato. Coxā vero, & fœmur,
& tibiā totam oleo in quo castoreum, eu-
phorbiū & styrax leuigata sunt, cōtinuo in-
ungito. At si coxendicis dolor diuturnus et
solutu cōtumax fuerit, ægrotāti clysteres ex
muria Nabathææ & nitro præparatos, in-
fundito. Collyriū quoq; ex cyclamine & syl-
uestri cucurbita cōiectū, & raphani & cepæ
decocto solutum, quousq; locus leniter exul-
ceretur superaccomodato, quoniam papulis
conciatatis, affectus subinde restitui consue-
uit. Si vero morbus in vetustatē inciderit,
sumito sinapis, & stercoreis colūbini æquas
partes, & eas tritas ficuū decocto excipito,

RHAZAE DE MOR. CVR. 1103.

ac in morem emplastri coxendicis regiōi superinducito, ac tantisper dum ex concitatis vesiculis sanies profluat, finito, & deinde locum aqua calida irrorato. Post hæc diebus aliquot, ægrum a medicaminum usu immunem reddito, siq̃ sanitati nō restituitur, eandem curandi rationem repetito, ac ita ægro tanti succurrito. Perro si affectus diuturnus ad multū tempus exercet, suspicioque sit luxationis capitis fœmoris ex coxendicis cotile, ob viscosi humoris vitium, aut si articulus iam luxatus fuerit, ad vñionē descendere oportet. Proinde ferreo instrumento instar rotæ adaptato, locum circa articulationis latera vrito, & in latius ossis summitatis, ac fœmoris capitis cute, ignito ferro aliam crustam inducito, prioremque ea ratione augeo. Verum huius rei tractationem præsentis libri termini haudquaquam admittunt.

Præter aut̃ oīa iam comprehensa, dū valet æger, vomitum sibi familiarem reddet, ac aluum facile respondentē, sibi procurabit. Preterea victus rationem (crassos cibos multāque temulentiam a se arcendo) extenuabit.

Ad

Recentiores Gracii
tres crustas vñt.

PARA. IN NONVM.

¶ Ad incipientem gibbum. Caput. xci.

Ab humo
re frigido,

¶ alias bal
sami,

QUum gibbus primū nasci cōperit, catapotia maiora ex hermodactylis porrigito, ac subinde olei † ligustici drachtes, cum seminum calidorum decocti vncijs tribus, propinato. Ad hæc partem oleo sam-
bucino in quo styrax liquida, castoreum, eu-
phorbium subacta sunt, illinito, & a crassis refrigerantibusq; cibis, ægrum arceto. Præ-
terea aquam calidam, cui mentastrum, sam-
psuchus & stichas Arabica, seu gallica inco-
cta sint, parti ab alto superfundito, in super
frequentes frictions, atq; ex calidioribus o-
leis inunctiones, tentato. Quod si hoc mor-
bo correptus puer fuerit, in calidam infusus,
ac ex iam enarratis oleis inunctiones, abun-
de auxiliabuntur. Verum si nūc primū
nascentem gibbum febris concomitetur, a
iam dicta curandi ratione, plane est disceden-
dum, & ex herbis infrigidantibus decoctum
cū cassia fistula potui propinandum. Item ve-
na quoq; axillaris percutienda, atq; empla-
stra ad dolētē locū vsq; vi sua refrigerādi per-
reptātia, affectę parti superaccomodāda sūt.

Ab inflam-
matione.

RHAZAE DE MOR. CVR. .104.

¶ De varicibus. Caput. xcii.

SI vena dilata ē & turgida et varijs orbi-
bus implicata viridioresq; in crure co-
spiciat, affectus a plerisq; vitis appellatus, ob
similitudinē quā cū vitis maioribus ramis
inaqualiter distributis habet, hominē affi-
cit. Quo morbo mulies labores pedibus subi-
re soliti, cibisq; melancholicū sanguinē coacer-
uantibus copiose se implētes, subinde effēdū-
tur. Inter initia itaq; prēsidiō vena axilla-
rē incidere expedit, ac his quæ bilē atrā edu-
cūt, quorū capite de melancholia meminimus,
alio rectissime subducetur, Et hæc pluries re-
iterāda sūt, & ab omnibus a quo melancholi-
ci arcētur, omnino praesenti affectu impliciti,
cohibēdi sunt. Postq; aut ad dies aliquot præ-
scripta curādi ratione vti sumus, sanguinis
detractionē e venis cruris itumescētibus, mo-
liri opportunū erit, ex quibus sanguis manare si-
nef, tātisq;per dū quiddā in illis collectū sit, ef-
fluxerit. In summa igitur, grossū bilem atram
evacuandis vti, veranq; axillare peritūde-
re cōfert, p̄inde & ab omnibus melancholicū
succū generātibus, abstinere opportunū est.

A crasso et
melancho-
lico sangui-
ne.

Excludnu-
tur iterdū
varices. vt
apud Pau.
li. 6. ca. 82.

De

PARA. IN NONVM.

¶ De elephantia. Caput. xciii.

Hic affectus postquam penitius radices
infixerit, nunquam curationem admittit. At si recens adhuc malum est, & manū
quis ei recte adhibet, eoque quo debet modo,
præsidia applicet, restituitur, aut saltem ne
inualescat augeaturq; illi prospicitur. Quan
do itaq; crura intumescunt, totusq; habitus
atro eolore suffunditur, & venæ quas vari
ces appellant apparent, frequentem vomitū
imperare conducit, similiter quoq; a nimia
obambulatione, & a recto corporis statu ab
stinere cōfert. Præterea venter secundū vo
mitū, catapotijs maioribus ex hermodacty
lis ducendus est, & deinde vomitus reiteran
dus. Hęc namq; subinde repetita iuuant, &
æger a crassorum'esu, vtiliter arcetur. Item
tibiā totam ligatura intercipere conuenit,
idq; vinculo prius in calcaneum iniecto, atq;
ita sursum ad genu deducto. Verum ante li
gationē, epithemata ex aloë, myrrha, acacia,
hypocistide, & alumine, simul omnibus in a
ceto acri detritis, præparata, cruri admoue
re ex usu est. Venam quoq; interiorē cubi
ti si

RHAZAE DE MOR. CVR. .109.

si si res expostulauerit, manus oppositæ incidere oportet. Caueat etiam ne rectus stet, nisi vniuerso crure exactissime deligato, & nulla ratione ab huiuscemodi epithematum vsu, abstineat. Item vomitum quoque identidem vtatur. Quod si æger statim a vomitu quietem petat, is brassicarum seminibus stichade Arabica, sarmentorum cinere, lupinis, nitro, caprino stercore, fœnogræci farina, simul in salita aqua decoctis, euaporandus est. Præterea vno atq; altero die ex lix nio fodus, optime facit, nam hoc propositi affectus, præcipuam partem discutit, aut saltem illum leniorem mitioremq; efficit.

¶ De lumborum rubore seu exulceratione.

Caput. xciiii.

Cum quispiam diutius supinus dorso incumbit renum regio rubet, vnde & lia, ma
ligna. parua, vlcuscula nonnunquam eueniunt. Quando itaque rubor intendi conspicitur, milium, aut panicum, aut salicis folia substernenda sunt, ægerq; frequenter ab incubitu subleuandus est. Ac hæc loca rubentia aqua rosacea niue refrigerata, irrorare euenti
○ lareq;

PARA. IN NONVM

Li. 7. ad
Almā. ca.
10.

lareque conducit. Verum calore non con-
quiescente, epithima Arabibus alubras di-
ctum ex aqua rosacea, camphora & alijs q-
busdam refrigerantibus succis præparatum,
veluti capite de phlegmone descriptum est,
summa utilitate superaccommodabitur.

Vel succus plumbi, supra ad vuluæ scissu-
ras inscriptus, utiliter loco inducetur. Iam
si papulæ, atque exulcerationes eboriantur,
unguento quod cerussa constat circumlitæ,
restituentur.

¶ De doloribus extremitatum, summarumque
partium. Caput. xcv.

DVM dolor aliquis, manum aut pedē
exercent, æger interrogandus est, an is
illi ex ictu, vel incidente quopiam corpore,
vel diuturno in partem innixu, vel alia qua-
cumq; manifesta causa, euenerit. Quoniam
si eius doloris externa causa autor non fue-
rit, affectum locum intueri oportet, an ne sci-
licet cæteris partibus plus minusue rubeat;
siquidem si vniuerso corpore magis rubore
suffusus fuerit, præsidia phlegmoni dicata, ex-
usu erunt. At si neq; calidior, neq; sanguino-
lentior

lentior percipiatur, sed si indies liuescat excetaturque, aquam calidam ab alto illi instillare confert. Item cera oleo macerata, inuncta, & tantisper dum conquieuerit dolor, in parte relicta, subsidium præstat. Cæterum si pars subtumida, manuum tactui subfrigida temperiem referat, subinde eam intricare expedit, ac aquam calidam in qua sampsuchus, chamæmelum & stichas Arabica ebulierint, parti infundere, vti iam diximus, vtile putatur. Dehinc oleo & luteorum violarum, quæ antiquis parietibus innascuntur, locus irrorabitur. At æger vitius rationem extenuabit, multoque exercitio vtetur. Item in laconicum primam balnei domum, vt sudorem prouocet, vtiliter ingreditur. Verû si hæc inualida fuerint, aliud serosum succum expurgantibus remedijs, ducenda est. Pars præterea si tactu frigida experiatur, primum fricanda est, deinde oleo costino, & sambucino, & oleo glandis vnguentarijs, & his viribus paribus, modiceq; inferuefactis, circumlinetur. At si hæc quocq; inefficacia fuerint, vnguentis, capite

Li 7. ad
Almā, ca.
10.

Offici
næ cheir
vocat.

PARA. IN NONVM
de neruorum resolutione compræhensis, do-
nec probe omni molestia ager libe-
retur, inter vngendū
vtemur.



FINIS Paraphraseos in nonum Rha-
zæ ad Regem Almanforem, de affectuū sin-
gularum corporis partium curatione,
per Andream Wesalium
Bruxellensem.



ANDREAS WESALIVS

Bruxellensis Candido

lectorī S. D.

Vereor Optime lector, undecumque delicatioribus auribus satisfactum non esse, quum interdum in hac nostra paraphrasi uoces quasdam ab Arabibus, & fere omnibus nostri temporis Medicis in medendi usu ritas reliquerim, quæ tamen nec uere latinæ dici possint, nec ab eruditis, in latina lingua scriptoribus (Plinium dico, Celsum, Largum, Varronem & Columellam) receptæ sint. Quare te hac succincta & extemporanea epistola admonendum duxi, non id ubique, sed interdum & necessario factum, nimirum in quibusdam simplicium medicaminum Græcis illisque autoribus incognitis nominibus, & aliquibus compositorum medicaminum formulis, cuiusmodi sunt, myrobalanorum Arabibus usurpata genera, tamarindi, camphora, iuleb, syrupus, electuarium, aliæque (si quæ reperiuntur) similia. Quidquid tamē sit, nullam omnino eius generis relictam existimo, quam nō alibi in libri marginibus, quibus interdum lectori consulere statui, aut orationis serie, prout res postulare uidebatur, explicauerim, meumq; quid de ea sentire iudiciū ad scripserim. Neque uero me fugit esse nonnullas, quæ latine quidem

EPIST. AD LECTOREM.

quidem græceve exprimi potuissent. Sed quoniā autores de his parū inter se consentire uiderentur, satius putauī, eas quoque quales reperissē, relinquere. Talia sunt, turbit, spodium, & si quæ ijs sunt cognatæ dictiones, quas tamē omnes huiuscemodi fere nota & uel semel saltem signari curauimus. Præter quam, & hæc & in ipso contextu dictionisque serie collocatas reperies, ut nimirum intelligas, quod quidquid his includitur, id Rhetorice omnino non sit. Quamquam nec omnia, quæ paraphrastica libertate interieci, his statim quoque characteribus ceu terminis intercipienda duximus, at ea dumtaxat, in quibus, aut propter prolixitatem, aut nouam inuentionem, a maiori quopiam perulātoris,que linguæ incusari possent.

Licet & id rarius, quum paraphrastes, nō autem

interpretis officium insecutus sim. Vale

le candidissime lector, & hunc

nostrum laborem, quem

primus inter

eos qui aliquid posteris in medi-

cina reliquerunt subi-

ui, bene con-

sule.

Anno. 1537.

Men. Mar.

ELENCHVS SIVE INDEX

breuis eorum, quæ capitibus
singulis huius libri
continentur.



1. De capitis dolore. fo. 4.
2. De uertigine, quam Græci σκοτάμα uo-
cant. fo. 8.
3. De phrenitide. fo. 9.
4. De apoplexia. fo. 10.
5. De leihargo. fo. 12.
6. De congelatis, quibus semper oculi inconniuen-
tes manent. fo. 12.
7. De neruorum resolutione, quæ παράλυσις di-
citur. fo. eodem.
8. De stupore & tremore. fo. 14.
9. De oris distortionem. fo. 15.
10. De conuulsione, quam σπασμὸς Græci uo-
cant. fo. eodem.
11. De morbo comitiali ἐπιληψία dicto. fo. 15.
12. De incubone, qui affectus ἐφιάλτης Græcis dici-
tur. fo. 18.
13. De melancholia. fo. 19.
14. De distillatione, raucitate, & grauedine.
folio. 22.

ELENCHVS

15. De lippitudine, quæ ὀφθαλμία Græcis vocatur. fo. 24.
16. De oculorum ulceribus. fo. 26.
17. De ea quæ oculis incidunt educenda. fo. 28.
18. De albugine oculo innata. fo. eodē.
19. De scabritie & tunricula. fo. 29.
20. Ad maiorum argulorum carunculas pruritu venatas. fo. eodē.
21. De ungui oculorum, quod πτερυγίον Græcis vocatur. fo. 30.
22. De uibice, ac cruentis suffusionibus ex ictu, aliaue causa. fo. 31.
23. Ad lachrymas. fo. eodē.
24. De visus debilitate. fo. eodē.
25. Ad palpebrarum tumorem, Græcis χέμοσις appellatur. fo. 32.
26. Ad palpebrarum pilos, oculos irritantes. fo. eod.
27. De suffusione, siue humorū in oculū affluxu. fo. eod.
28. Ad nocturnam cæcitudinem, quæ νυκταλωΐ Græcis dicitur. fo. 34.
29. De dilatatione pupillæ. fo. eodem.
30. De fistulis maioribus oculi angulis accidentibus. fo. 35.
31. De aurium dolore. fo. 36.

CAPITVM.

32. De auris ulcere. fo. 37.
33. De sonitu & tinnitu aurium. fo. eod.
34. Ad grauem auditum. fo. 38.
35. Ad aurium uermes, & animalcula auditus meatum irrepentia. fo. 38.
36. Ad ea quæ in meatum auditorium incidunt euellenda. fo. eodē.
37. Ad sanguinem e naribus erumpentem. fo. eodē.
38. Ad narium crustas & ulcera. fo. 40.
39. De polypo & sarcomate. fo. eodē.
40. De oblæsa olfaciendi facultate. fo. 41.
41. De dentium & gingiuarum dolore. fo. 42.
42. Medicamenta eradicantia & confringentia dentes. fo. 43.
43. Ad refriktionem & stuporem dentium. fo. 44.
44. Ad dentes, qui frigidi cōtaëtū indole scūt. fo. eod.
45. De linguæ orisq; superficiarijs ulceribus. fo. eod.
46. De gingiuis sanguine humentibus. fo. 45.
47. De laxatione procidentiaue gargarionis. fo. eod.
48. De hirudinibus gutturi incidentibus, aut alijs reptilibus fortuito irreptantibus. fo. 46.
49. De his quæ in os, seu cœsophagum prolabuntur. fo. eodem.
50. Ad oblæsum linguæ sensum & motum, ac deficientem

ELENCHVS

- tem motum . fo. 47.
51. Ad linguam in nimiam molem intumescen-
tem. fo. 48.
52. De tumore sub lingua enato, qui ranula dici-
tur. fo. eodē.
53. Ad pustulas ac tumores linguæ. fo. eodē.
54. De angina. folio eodem.
55. De tussi. fo. 49.
56. De difficultate spirandi, quam Græci ἀσπνία ap-
pellant. fo. 51.
57. De laterali dolore, qui πλευρίτις Græcis dici-
tur. fo. eodē.
58. De pulmonum inflammatione, quæ περιπνευµο-
νις Græcis dicitur. fo. 53.
59. De cruentis ac purulentis exruptionibus. fo.
lio eodem.
60. De tabe, quæ φθίσις Græcis dicitur. fo. 55.
61. De cordis palpitatione. folio eodem.
62. De cholera morbo. fo. 56.
63. De uentriculi imbecillitate. fo. 58.
64. De oris uentriculi dolore, ac inflammatione. fo.
lio 61.
65. De singultu. fo. 64.
66. De canino appetitu. fo. 65.

CAPITVM.

67. De iocinoris dolore. folio eodẽ.
68. De morbo regio, qui ἰκτερος Græcis dicitur. fol. 67.
69. De aqua inter cutem, quæ ὑδρωψ Græcis dicitur. fol. 68.
70. De lienis dolore. fol. 70.
71. De morbis intestini plenioris & tenuioris, hic ἰλεος, ille κολικος Græcis dicitur. fol. 71.
72. De uentris profluuiio. fol. 76.
73. De urinæ difficultate. folio. 81.
74. De renum & uesticæ calculo. fol. 83.
75. De renum & uesticæ inflammatione. fol. 85.
76. De urinæ ardore. fol. 86.
77. Ad sanguinem & pus mingentes. folio eodem.
78. De his qui inuiti urinam reddunt. folio. 87.
79. De lumbricis in ano ac uentre natis. fol. 89.
80. De hæmorrhoidibus, scissuris, & fistulis ani. folio eodem,
81. Ad procidentiam ani & uulvæ. fol. 93.
82. Ad menses confertim erumpentes. fol. 94.
83. Ad suppressos menses citandos. fol. eod.
84. De uulvæ scissuris. folio. 95.
85. De uulvæ inflammatione. fol. eodem.
86. De uulvæ strangulatu. fol. 96.

ELENCHVS CAPITVM.

- 87. De mola uteri. fo. 97.
- 88. De ramicum generibus. fo. 98.
- 89. De podagra, reliquisque articularijs morbis.
folio . 99.
- 91. Ad incipientem gibbum. fo. 103.
- 92. De uaricibus. fo. 104.
- 93. De elephantia. fo. eodẽ.
- 94. De lumborum rubore, seu exulceratione .
folio. 105.
- De doloribus extremitatum, summarumue par-
tium, fo. eodem.

FINIS.

ERRATA.

Folio. 2. pa. i. vers. 7. tijs. 6. 2. 24. species. 14. 2. 6.
 hæc simul. 16. 2. comiti. 17. 2. 15. malleo. 17. 2.
 19. aceto. 22. 1. 16. myroba. 23. 1. 9. decem. 24.
 24. 2. 16. rum, ta. 26. 2. 14. vlcis curatio. 27. 1. 11.
 accommo. 31. 1. hysso. 32. 2. 3. afflux. 33. 1. 13. men.
 37. 1. 1. cet) ægrotantem intra. 40. 1. 10. rium
 efficacius tra. 8. 16. hypo. 2. linea 14. in margine, Ex
 pituita. 47. deglu. 49. carica. 52. α. 53. 2. 18. strat. 1
 21. 57. 18. abiici. 22. Quod si. 64. rute. 67. 1. maticum. &
 26. semiss. 76. ribes. 95. Quare. 86. syrapi. 93. collyr.

Ad reliqua leuioris momenti lector
 pius facile conuiebit.